

## Serie 3

Aufgabe 1 ist online zu lösen. Schicken Sie Ihre Lösung bis spätestens **Freitag, den 20. Oktober um 14:00 Uhr** ab.

Die schriftlichen Aufgaben können Sie am selben Tag in Ihrer Übungsstunde abgeben oder im entsprechenden Fach im **HG J 68**.

---

1. Gegeben seien die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

und der Vektor

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Für welche Werte  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$  ist das LGS  $Ax = b$  lösbar?

- (a) Für alle  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ .
- (b) Für keine  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ .
- (c) Für alle  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$  mit  $b_3 + b_2 - b_1 = 0$ .
- (d) Für alle  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$  mit  $b_3 + b_2 - b_1 \neq 0$ .
- (e) Das lässt sich nicht entscheiden.

**2.**

a) Für welche Werte von  $t$  schneiden sich die vier Ebenen im  $\mathbb{R}^3$ ?

$$\begin{aligned} y + z &= 0 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + y &= 2t \\ 2(x - y) + t(z + 1) &= 0. \end{aligned}$$

b) Das folgende MATLAB-Script visualisiert die Lösung des LGS

$$x + y - z = 5, \quad x - y - z = 0, \quad 4x - z = 2.$$

```
ezsurf('x+y-5')
% plottet den Graphen der Funktion z=f(x,y)=x+y-5 (Sie koennen
% auch andere (zwei) Variabelnamen waehlen)
hold on
% hold dient dazu, alle Graphen in derselben Figur anzuordnen
% (Figur nicht schliessen waehrend dem Ausfuehren der Befehle)
ezsurf('x-y')
ezsurf('4*x-2')
hold off
```

Ändern Sie dieses Script so ab, dass es für die im Teil **a)** gefundenen Werte von  $t$  den Schnitt der vier Ebenen visualisiert.

**3.**

a) Lösen Sie für  $n \geq 2$  das lineare Gleichungssystem

$$\sum_{i=1}^n (i - k)x_i = 1 \quad \text{für } k = 1, 2, \dots, n.$$

b) Lösen Sie für  $n \geq 1$  das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} y_0 &= 0 \\ y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1} &= 0 \quad \text{für } k = 1, 2, \dots, n. \\ y_{n+1} &= 1 \end{aligned}$$

**4. Numerische Problematik bei linearen Gleichungssystemen:**

a) Lösen Sie

$$\begin{pmatrix} 1044.005 & 696 \\ 174 & 116 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 696 \\ 116 \end{pmatrix}.$$

b) "Lösen" Sie mit einem gewöhnlichen Taschenrechner

$$\begin{pmatrix} 1044.0045 & 696.0028 \\ 174.0008 & 116.0005 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 696.0034 \\ 116.0006 \end{pmatrix}.$$

c) Zeigen Sie, dass jedes  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ , das zur Lösungsmenge beider Gleichungssysteme

$$\begin{pmatrix} 1044 & 696 \\ 174 & 116 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 696 \\ 116 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 45 & 28 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 6 \end{pmatrix}$$

gehört, auch eine Lösung von **b)** ist und lösen Sie damit **b)**.