

## 5. Der allgemeine Cauchysche Integralsatz

### 5.1 Homotopien, einfach zshg. Gebiete

Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen,  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^0([0,1], \Omega)$


mit

$$\gamma_0(0) = z_0 = \gamma_1(0), \quad \gamma_0(1) = z_1 = \gamma_1(1).$$

Def. 5.1.1. i)  $\gamma_0$  und  $\gamma_1$  heißen zu einander homotop (bei festen Endpunkten), falls  $\gamma \in C^0([0,1] \times [0,1], \Omega)$  existiert mit

$$\gamma(0,t) = \gamma_0(t), \quad \gamma(1,t) = \gamma_1(t), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$\gamma(s,0) = z_0, \quad \gamma(s,1) = z_1, \quad 0 \leq s \leq 1,$$



ii) Falls  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  
so heißt  $\gamma$  eine

$C^k$ -Homotopie, falls  $\gamma \in C^k$ ;  
insbesondere gilt dann:

$$\forall s \in [0,1]: \gamma_s = \gamma(s, \cdot) \in C^k,$$

$$s \mapsto \gamma_s \in C^k \text{ stetig.}$$

Bem. 5.1.1. Für homotope  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , gibt  
es stets eine  $C^k$ -Homotopie.

Zum Beweis benutzen wir das Hilfsmittel der Faltung einer Funktion  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  mit einem glättenden Kern.


Sei dazu  $0 \leq \rho = \rho(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  mit  $\text{supp}(\rho) \subset B_1(0)$  und

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) dx = 1,$$

Für  $0 < \varepsilon < 1$  setze  $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \in C_c^\infty(B_\varepsilon(0)) \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$

mit  $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) dx \stackrel{(z = \frac{x}{\varepsilon})}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \rho(y) dy = 1 \quad (5.1.1)$

und zu gegebenem  $f \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$  setze



$$(f * \rho_\varepsilon)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \rho_\varepsilon(y) dy \quad (5.1.2)$$

$$\stackrel{(z = x-y)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \rho_\varepsilon(x-z) dz \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

mit  $d(f * \rho_\varepsilon) = (df * \rho_\varepsilon)$  wegen (5.1.2) und mit

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{C^0} \stackrel{(5.1.1)}{=} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) \rho_\varepsilon(y) dy \right|$$

$$(5.1.3) \quad \leq \underbrace{\sup_{\substack{x, y \in \mathbb{R}^n \\ |y| < \varepsilon}} |f(x-y) - f(x)|}_{\rightarrow 0 \ (\varepsilon \downarrow 0)} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) dy}_{=1, \geq 0},$$

da  $\text{supp}(f)$  nach Annahme kompakt,  $f$  also gleichmäßig stetig, analog für die Ableitung  $df$ .

Bew. von Bew. 5.1.1. Nach Umparametrisierung

$$\tilde{\gamma}_0(t) = (\gamma_0 \circ \varphi)(t), \text{ etc, mit } \varphi \in C^1([0,1], [0,1]), \text{ wo}$$

$$\varphi' \geq 0, \varphi(t) = 0 \text{ f\u00fcr } t \leq \varepsilon_0, \varphi(t) = 1 \text{ f\u00fcr } t \geq 1 - \varepsilon_0$$

f\u00fcr eine Zahl  $0 < \varepsilon_0 < \frac{1}{2}$ , d\u00fcrfen wir annehmen,

da\u00df gilt



$$\gamma_{0,1}(t) = \gamma_{0,1}(0) = z_0 \text{ f\u00fcr } 0 \leq t \leq \varepsilon_0,$$

$$\gamma_{0,1}(t) = \gamma_{0,1}(1) = z_1 \text{ f\u00fcr } 1 - \varepsilon_0 \leq t \leq 1,$$

sowie

$$\gamma(s, \cdot) = \gamma_0 \text{ f\u00fcr } 0 \leq s \leq \varepsilon_0,$$

$$\gamma(s, \cdot) = \gamma_1 \text{ f\u00fcr } 1 - \varepsilon_0 \leq s \leq 1.$$



Sei  $0 \leq \rho = \rho(s,t) \in C_c^\infty(\mathbb{B}_1(0))$  ein gl\u00e4ttender Kern.

F\u00fcr  $0 < 2\varepsilon \leq \varepsilon_0$  gl\u00e4tte zun\u00e4chst  $\gamma_0^\varepsilon \equiv \gamma_s^\varepsilon = \gamma(\varepsilon, \cdot)$ ,  $0 \leq s \leq \varepsilon_0$ ,

durch

$$\gamma^{(\varepsilon)}(s,t) = (\gamma_0^\varepsilon * \rho_\varepsilon)(s,t), \quad 0 \leq s \leq \varepsilon \leq t \leq 1 - \varepsilon.$$

Da  $\gamma_0 \in C^1$ , folgt mit (5.1.2) auch  
 $\gamma_s^{(\varepsilon)} = \gamma^{(\varepsilon)}(s, \cdot) \in C^1$  für  $0 \leq s \leq \varepsilon$ , und  
 (5.1.3) ergibt  $\gamma_s^{(\varepsilon)} \Rightarrow \gamma_0$  in  $C^1$  für  $s \downarrow 0$ .

(Betrachte  $f = \gamma_0$ , bzw.  $f = \dot{\gamma}_0$ .)

Analog glätten wir  $\gamma_1 = \gamma_s$ ,  $1 - \varepsilon_0 \leq s \leq 1$ ,  
 indem wir setzen

$$\gamma^{(\varepsilon)}(s, t) = (\gamma_1 * \rho_{1-s})(s, t), \quad \varepsilon \leq t \leq 1 - \varepsilon \leq s \leq 1.$$

Weiter setzen wir

$$\gamma^{(\varepsilon)}(s, t) = z_0, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad 0 \leq t \leq \varepsilon,$$

$$\gamma^{(\varepsilon)}(s, t) = z_1, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad 1 - \varepsilon \leq t \leq 1,$$

und schließlich

$$\gamma^{(\varepsilon)}(s, t) = (\gamma * \rho_\varepsilon)(s, t), \quad \varepsilon \leq s, t \leq 1 - \varepsilon,$$

um die gewünschte  $C^1$ -Homotopie zu erhalten.

Der Cauchy'sche Integralsatz (Satz 3.3.2) liefert das folgende Resultat.

Satz 5.1.1. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph, und seien  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^1([0,1]; \Omega)$  homotop bei festen Endpunkten. Dann gilt

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Bew.: Sei  $\gamma \in C^0([0,1]^2; \Omega)$  eine  $C^1$ -Homotopie von  $\gamma_0$  zu  $\gamma_1$ . Da

$$K = \gamma([0,1]^2) \subset \Omega$$

kompakt, gibt es  $r > 0$  mit

$$\text{dist}(K, \partial\Omega) > r,$$

und endlich viele Bälle  $B_r(z_l)$ ,  $1 \leq l \leq L$ , mit  $z_l \in K$ , so daß  $\overline{B_r(z_l)} \subset \Omega$ ,  $1 \leq l \leq L$ , überdecken  $K$ .

Für  $0 \leq s \leq 1$  setze  $\gamma_s(t) := \gamma(s,t)$  mit  $\gamma_s \in C^1([0,1]; \Omega)$ , und definiere

$$F(s) := \int_{\gamma_s} f(z) dz \in \mathbb{C}.$$

Beh.:  $F(s) = F(0) = \int_{\gamma_0} f(z) dz$  für  $0 \leq s \leq 1$ .

Bew.: Setze

$$I = \{s \in [0, 1], F(s) = F(0)\}.$$

Dann gilt  $0 \in I$ ; also  $I \neq \emptyset$ .

Da  $s \mapsto \gamma_s \in C^1$  nach Voraussetzung stetig ist, ist auch die Abbildung

$$s \mapsto F(s) = \int_0^1 f(\gamma_s(t)) \dot{\gamma}_s(t) dt$$

stetig;  $I$  ist also auch abgeschlossen.

Sei schließlich  $s_0 \in I$ . Wir zeigen:

$$\exists \delta > 0 \forall 0 \leq s \leq 1: |s - s_0| < \delta \Rightarrow F(s) = F(s_0) = F(0).$$

Sei dazu

$$\text{im}(\gamma_{s_0}) = \gamma_{s_0}([0, 1]) \subset \bigcup_{i=1}^{i_0} \mathcal{B}_r(z_i),$$

wobei für  $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_{i_0} = 1$  gelte

$$(5.1.1) \quad \gamma_{s_0}([t_{i-1}, t_i]) \subset \mathcal{B}_r(z_i), \quad 1 \leq i \leq i_0$$


und damit insbesondere

$$(5.1.2) \quad \gamma_{s_0}(t_i) \in \mathcal{B}_r(z_i) \cap \mathcal{B}_r(z_{i+1}), \quad 1 \leq i \leq i_0.$$

(Die Punkte  $z_i$ ,  $1 \leq i \leq i_0$ , sind nicht unbedingt paarweise verschieden.)

Da  $B_r(z_i)$  offen für jedes  $i$ , gibt es  $\delta > 0$  mit der Eigenschaft, daß für alle  $s \in [0, 1]$  mit  $|s - s_0| < \delta$  die

Beziehungen (5.1.1), (5.1.2) auch gelten für  $\gamma_s$ .



Da  $B_r(z_i) \cap B_r(z_{i+1})$  konvex können wir für jedes  $1 \leq i \leq i_0$  die Bögen

$$\gamma_{s_0}|_{[t_{i-1}, t_i]}, \gamma_s|_{[t_{i-1}, t_i]}$$

durch Hinzunahme der

geraden Verbindungsstrecken  $\gamma^{(i-1)}$ , bzw.  $\gamma^{(i)}$ , wobei

$$\gamma^{(j)}(t) = t \gamma_s(t_j) + (1-t) \gamma_{s_0}(t_j), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

zu geschlossenen Kurven

$$\Gamma_i = \gamma_{s_0}|_{[t_{i-1}, t_i]} + \gamma^{(i)} - \gamma_s|_{[t_{i-1}, t_i]} - \gamma^{(i-1)}$$

in  $B_r(z_i)$  ergänzen. Mit Satz 3.3.2 folgt

$$F(s_0) - F(s) = \int_{\gamma_0} \varphi(z) dz - \int_{\gamma} \varphi(z) dz = \sum_{i=1}^{i_0} \int_{\Gamma_i} \varphi(z) dz = 0.$$

Also ist  $I$  auch offen, und damit  $I = [0, 1]$ .  $\square$

Def. 5.1.2. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen. Dann heißt  $\Omega$  einfach zusammenhängend (1-zshg.), falls je zwei Kurven  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^0([0,1]; \Omega)$  mit denselben Endpunkten zueinander homotop sind.

Bem. 5.1.2. i) Insbesondere ist in einem 1-zshg. Gebiet  $\Omega \subset \mathbb{C}$  dann jede geschlossene Kurve  $\gamma \in C^0([0,1]; \Omega)$  mit  $\gamma(0) = \gamma(1) = z_0$  homotop zum konstanten Weg  $\gamma_0(t) = z_0, 0 \leq t \leq 1$ ; d.h. jede geschlossene Kurve ist "zusammenziehbar".


ii) Umgekehrt gilt: Ist jede geschlossene Kurve  $\gamma \in C^0([0,1]; \Omega)$  zusammenziehbar, so ist  $\Omega$  1-zshg.

Beisp. 5.1.1. i) Jeder Ball  $B = B_R(z_0)$  ist 1-zshg.

Bew.: Für je zwei Kurven  $\gamma_0, \gamma_1 \in C^0([0,1]; B)$  mit  $\gamma_0(0) = \gamma_1(0), \gamma_0(1) = \gamma_1(1)$  ist  $\gamma \in C^0([0,1]^2; B)$

mit  $\gamma(s,t) = (1-s)\gamma_0(t) + s\gamma_1(t)$

eine Homotopie von  $\gamma_0$  nach  $\gamma_1$





ii) Allgemeiner zeigt der Beweis von i), daß jedes konvexe Gebiet  $\Omega$  1-zshg. ist.

iii) Das Gebiet  $\Omega = \mathbb{C} \setminus (]-\infty, 0])$  ist 1-zshg, da

$$\Phi: ]0, \infty[ \times ]-\pi, \pi[ \ni (r, \theta) \mapsto r e^{i\theta} \in \Omega$$

einen Homöomorphismus von  $\Omega$  auf ein 1-zshg. Gebiet definiert.

iv) Die Menge  $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  ist nicht 1-zshg.

Bew.: Andernfalls müßte nach Bem. 5.1.2.i) und Satz 5.1.1 für jede holomorphe Funktion  $f$  und jede geschlossene Kurve  $\gamma \in C_{pw}^1([0,1], \mathbb{R})$

gelten  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ ;

jedoch erhalten wir für  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z \neq 0$ , und  $\gamma = \partial B_r(0)$ ,  $r > 0$ , gemäß Satz 3.4.1

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\partial B_r(0)} \frac{dz}{z} = 2\pi i \neq 0.$$

Satz 3.1.1 und Satz 5.1.1 ergeben sofort das folgende Resultat.

Satz 5.1.2. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen, 1-zshg,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph. Dann gibt es eine holomorphe Funktion  $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $F' = f$ .

Bew.: Nach Satz 5.1.1 ist für jede Kurve  $\gamma \in C_{pw}^1([0, 1]; \Omega)$  das Integral  $\int_{\gamma} f(z) dz$  nur abhängig von den Endpunkten von  $\gamma$ , und Satz 3.1.1 liefert das gewünschte  $F$ . □

Insbesondere erhalten wir

Kor. 5.1.1 (Cauchy) Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen und 1-zshg,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph,  $\gamma \in C_{pw}^1([0, 1]; \Omega)$  geschlossen. Dann gilt

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

## 5.2 Der komplexe Logarithmus

Auf jedem 1-zshg., offenen  $\Omega \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$  mit  $1 \in \Omega$  können wir einen "Zweig" des komplexen Logarithmus einführen.

Satz 5.2.1. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen, 1-zshg. und mit  $1 \in \Omega$ ,  $0 \notin \Omega$ . Dann gibt es eine eindeutig bestimmte holomorphe Funktion  $F(z) = \log_{\Omega}(z)$ ,  $z \in \Omega$ , mit

i)  $e^{F(z)} = z, z \in \Omega,$

ii)  $F(1) = 0.$

Bew.: Für  $z \in \Omega$  setze

$$F(z) := \int_{\gamma} \frac{dz}{z},$$

wobei  $\gamma \in C^1([0, 1]; \Omega)$  ein beliebiger Weg ist mit  $\gamma(0) = 1, \gamma(1) = z.$

Da  $\Omega$  nach Annahme 1-zshg mit  $\partial \notin \Omega$ , ist  $\bar{F}$  wohldefiniert, und wie im Beweis von Satz 3.1.1. ist  $\bar{F}$  holomorph mit

$$\bar{F}'(z) = \frac{1}{z}, \quad z \in \Omega.$$

Nach Konstruktion gilt  $\bar{F}(1) = 0$ .

Weiter gilt

$$\frac{d}{dz} \left( z e^{-\bar{F}(z)} \right) = e^{-\bar{F}(z)} (1 - z \bar{F}'(z)) = 0;$$

also

$$z e^{-\bar{F}(z)} = 1 e^{-\bar{F}(1)} = 1, \quad z \in \Omega. \quad \square$$

Bem. 5.2.1. i) Für  $\Omega = \mathbb{C} \setminus (1-\infty, 0]$

erhalten wir mittels Satz 5.2.1 den bereits früher eingeführten Hauptzweig des Logarithmus zurück.

ii) Für ein offenes 1-zweig.  $\Omega \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$   
mit  $1 \in \Omega$  und ein beliebiges  $\alpha \in \mathbb{C}$   
können wir nun die allgemeine Potenz

$$z^\alpha := \exp\left(\alpha \log_\Omega(z)\right), \quad z \in \Omega,$$

eingeführen. Diese ist jedoch stets  
abhängig vom gewählten Gebiet  $\Omega$ .

iii) Vorsicht ist jedoch geboten bei der  
Anwendung der üblichen Rechenregeln!

z.B. gilt für den Hauptzweig des Logarithmus  
bei Wahl von  $z_1 = z_2 = e^{2\pi i/3}$ ,  $z_1 z_2 = e^{4\pi i/3} = e^{-2\pi i/3}$

nach Definition

$$\log(z_1 z_2) = -2\pi i/3 \neq \log(z_1) + \log(z_2) = 4\pi i/3$$

Somit gilt auch

$$(z_1 z_2)^i = \exp\left(i \log(z_1 z_2)\right) = e^{2\pi/3},$$

während  $z_1^i = \exp(i \log z_1) = e^{-2\pi/3}$

also  $z_1^i \cdot z_2^i = e^{-4\pi/3} \neq (z_1 z_2)^i$ .

Satz 5.2.2. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen, 1-zelig,  
 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  holomorph. Dann  
 gibt es  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph mit  

$$e^{g(z)} = f(z), \quad z \in \Omega.$$

Bem. 5.2.2.  $g$  ist eindeutig bis  
 auf Vielfache von  $2\pi i$  bestimmt  
 und definiert einen Zweig der  
 Funktion  $\log(f(z))$ ,  $z \in \Omega$ .

Bew. von Satz 5.2.2: Fixiere  $z_0 \in \Omega$ .  
 Für  $z \in \Omega$  setze

$$g(z) := \int_{\gamma} \underbrace{\frac{f'(z)}{f(z)}}_{= (\log f)'(z)} dz + c_0$$

wobei  $\gamma \in C_{pw}^1([0, 1], \Omega)$  eine beliebige  
 Kurve ist von  $\gamma(0) = z_0$  nach  $\gamma(1) = z$ ,  
 und mit zu bestimmendem  $c_0 \in \mathbb{C}$ .

Wie im Beweis von Satz 3.1.1 ist

$g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  wohldefiniert und holomorph  
mit

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}, \quad z \in \Omega,$$

so daß

$$\frac{d}{dz} \left( f(z) e^{-g(z)} \right) = e^{-g(z)} \underbrace{\left( f'(z) - f(z)g'(z) \right)}_{=0} = 0.$$

Es folgt

$$f(z) e^{-g(z)} = f(z_0) e^{-c_0}, \quad z \in \Omega.$$

Wähle  $c_0 \in \mathbb{C}$  mit  $e^{c_0} = f(z_0)$ .  $\square$

### 5.3 Pauze Funktionen

Gibt es eine Beziehung zwischen den Nullstellen einer holomorphen Funktion  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  und ihrem Verhalten

für  $|z| \rightarrow \infty$ ? Kann man  $f$  aus seinen

Nullstellen wie ein Polynom durch Zerlegung in Linearfaktoren (bis auf einen Faktor in  $\mathbb{C}$ ) rekonstruieren?

Satz 5.3.1 (Jensen) Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen,

$B = B_{\mathbb{R}}(0) \subset \bar{B} \subset \Omega$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph mit  $f(z) \neq 0$  für  $z \in \partial B$ ,  $f(0) \neq 0$ . Dann

gilt

$$\log |f(0)| = \sum_{k=1}^K \log \left( \frac{|z_k|}{R} \right) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta,$$

wobei  $z_1, \dots, z_K$  die Nullstellen von  $f$  in  $B$  bezeichnet und jede Nullstelle entsprechend ihrer Multiplizität  $n_k$ -mal in der Aufzählung erscheint.



Eine wichtige Rolle beim Beweis spielt der Cauchy'sche Darstellungssatz in der folgenden Form.

Satz 5.3.2 (Mittelwerteigenschaft)

Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen,  $B = B_R(0) \subset \overline{B} \subset \Omega$ ,

$f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph. Dann gilt

$$(5.3.1) \quad f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta}) d\theta.$$

Falls weiter  $f = u + iv$  mit  $u = \operatorname{Re}(f)$ ,  
so gilt

$$(5.3.2) \quad u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) d\theta.$$

Bew.: Nach Satz 3.4.1 gilt mit

$$\gamma(t) = Re^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B} \frac{f(z)}{z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(\gamma(t))}{\gamma(t)} \dot{\gamma}(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) dt, \end{aligned}$$

also (5.3.1). Die Formel (5.3.2) folgt nach  
"Übergang zum Realteil in (5.3.1). □

Weiter benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 5.3.1, Sei  $a \in \mathbb{C}$  mit  $|a| < 1$ ,

Dann gilt

$$\int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta = 0.$$

Bew.: Die Funktion  $f(z) = 1 - az$ ,  $z \in \mathbb{C}$ , ist holomorph mit  $f(z) \neq 0$  für  $|z| \leq 1$ .

Also gibt es  $R > 1$  mit  $f(z) \neq 0$ ,  $z \in \mathbb{B}_R(0)$ .

Nach Satz 5.2.2 gibt es  $g: \mathbb{B}_R(0) \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph mit  $f(z) = e^{g(z)}$ ,  $z \in \mathbb{B}_R(0)$ ,

und

$$\log |f(z)| = \log \left( e^{\operatorname{Re}(g(z))} \right) = \operatorname{Re}(g(z)).$$

Mit (5.3.2) folgt

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{i\theta}| d\theta &= \int_0^{2\pi} \log |f(e^{i\theta})| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}(g(e^{i\theta})) d\theta = 2\pi \operatorname{Re}(g(0)) \\ &= 2\pi \log \underbrace{|f(0)|}_{=1} = 0. \end{aligned}$$

□

Bew. von Satz 5.3.1: Wir beweisen den Satz in 4 Schritten.

i) Nimm an, der Satz gilt für  $f_1$  und  $f_2$ .  
Da  $f = f_1 f_2$  genau dort verschwindet, wo entweder  $f_1$  oder  $f_2$  verschwindet, und da

$$\log |f_1 f_2| = \log |f_1| + \log |f_2|$$

für den reellen Logarithmus, folgt die Aussage für  $f = f_1 f_2$ .

ii) Falls  $z_1, \dots, z_k \in B$  die Nullstellen von  $f$  mit Multiplizität bezeichnet, so hat die holomorphe Funktion

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z-z_1) \cdots (z-z_k)}, \quad z \in U \setminus \{z_1, \dots, z_k\},$$

wo  $U \subset \Omega$  eine offene Umgebung von  $B$ , hebbare Singularitäten bei  $z_1, \dots, z_k$ ; also

$$f(z) = (z-z_1) \cdots (z-z_k) g(z)$$

mit holomorphem  $g: U \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

iii) O.B.d.A. dürfen wir annehmen,  
daß  $U$  1-zshg. Nach Satz 5.2.2  
gibt es  $h: U \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph  
mit  $g = e^h$ ; insbesondere gilt

$$|g(z)| = e^{\operatorname{Re}(h(z))}, \quad z \in U,$$

und mit (5.3.2) folgt

$$\begin{aligned} \log |g(0)| &= \operatorname{Re}(h(0)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}(h(Re^{i\theta})) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(Re^{i\theta})| d\theta. \end{aligned}$$

iv) Fixiere  $1 \leq k \leq K$ . Für  $f_k(z) = z - z_k, z \in \mathbb{C}$ ,  
gilt nach Lemma 5.3.1

$$\int_0^{2\pi} \log |f_k(Re^{i\theta})| d\theta = \int_0^{2\pi} \log |Re^{i\theta} - z_k| d\theta$$

$$= 2\pi \log R + \int_0^{2\pi} \log \left| e^{i\theta} - \underbrace{\frac{z_k}{R}}_{=: a \in \mathbb{B}_1(0)} \right| d\theta$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{(t=-\theta)}{=} 2\pi \log R - \underbrace{\int_0^{2\pi} \log |1 - ae^{it}| dt}_{=0} = 2\pi \log R. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\log |f_k(0)| = \log |z_k| =$$

$$= \log \left( \frac{|z_k|}{R} \right) + \log R$$

$$= \log \left( \frac{|z_k|}{R} \right) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f_k(Re^{i\theta})| d\theta.$$

Mit i) - iii) liefert dies die Aussage  
des Satzes. □

Für holomorphes  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $r > 0$  sei

$$n(r) = n_f(r) = \# \{z \in B_r(0); f(z) = 0\},$$

wobei jede Nullstelle mit ihrer Multiplizität  
gezählt wird.

Lemma 5.3.2. Für  $R > 0$  gilt

$$\int_0^R n(r) \frac{dr}{r} = \sum_{k=1}^K \log \left( \frac{R}{|z_k|} \right),$$

falls  $f(0) \neq 0$ , wobei  $z_1, \dots, z_K \in B_R(0)$  die Nullstellen von  $f$  mit Multiplizität bezeichnet.

Bew.: Für  $1 \leq k \leq K$  gilt

$$\int_{|z_k|}^R \frac{dr}{r} = \log \left( \frac{R}{|z_k|} \right).$$

Mit  $\chi_k(r) = \begin{cases} 1, & r > |z_k| \\ 0, & r \leq |z_k| \end{cases}, \quad 1 \leq k \leq K,$

folgt  $n(r) = \sum_{k=1}^K \chi_k(r), \quad 0 < r < R$ , also

$$\begin{aligned} \int_0^R n(r) \frac{dr}{r} &= \sum_{k=1}^K \int_0^R \chi_k(r) \frac{dr}{r} \\ &= \sum_{k=1}^K \int_{|z_k|}^R \frac{dr}{r} = \sum_{k=1}^K \log \left( \frac{R}{|z_k|} \right). \end{aligned}$$

□

Def. 5.3.1: Sei  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph,  $\rho > 0$ .

i) Die Funktion  $f$  hat Wachstumsordnung  $\leq \rho$ , falls gilt

$$\exists A, B > 0 \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq A \exp(B|z|^\rho).$$

ii) Die Ordnung des Wachstums von  $f$  ist dann  $\rho_f := \inf \{ \rho > 0; f \text{ hat Wachstumsordnung } \leq \rho \}$ .

Beisp. 5.3.1. Für  $f(z) = e^{z^2}$ ,  $z \in \mathbb{C}$ , gilt  $\rho_f = 2$ .

Satz 5.3.3. Sei  $f$  ganz mit  $\rho_f < \rho$ . Dann gilt

i)  $\exists C > 0 \forall r > 1 : n(r) \leq Cr^\rho$ .

ii) Sind  $z_1, z_2, \dots$  die Nullstellen  $z_k \neq 0$  von  $f$  mit Multiplizität  $s_k$ , so gilt für jedes  $s > \rho$ , daß

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|z_k|^s} < \infty.$$

Bew.: i) O.B.d.A. dürfen wir annehmen, daß  $f(0) \neq 0$ .

Betrachte sonst die holomorphe Funktion

$g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $g(z) = f(z)/z^{n_0}$ , wobei  $n_0 \in \mathbb{N}$  die Ordnung der Nullstelle  $z_0 = 0$  ist, mit  $\rho_g \leq \rho_f$ .  
Mit  $n_g(r) \leq Cr^\rho$  folgt dann auch i) für  $f$ .

Mit Lemma 5.3.2 und Satz 5.3.1 erhalten wir für ganzes  $f$  mit  $f(0) \neq 0$  für  $R > 0$  mit  $f(z) \neq 0$  für  $|z| = R$  die Identität

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta &= \log |f(0)| \\ &= - \sum_{k=1}^{\kappa} \log \left| \frac{z_k}{R} \right| = \sum_{k=1}^{\kappa} \log \left( \frac{R}{|z_k|} \right) = \int_0^R n(s) \frac{ds}{s}. \end{aligned}$$

Da  $n(s) \geq 0$ , folgt für  $R = 2r$  somit

$$\int_r^{2r} n(s) \frac{ds}{s} \leq \int_0^{2r} n(s) \frac{ds}{s} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \log |f(0)|,$$

$$\text{und} \quad \int_r^{2r} n(s) \frac{ds}{s} \geq n(r) \int_r^{2r} \frac{ds}{s} = \log 2 \cdot n(r),$$

da  $n(r)$  nicht fallend,

Die Wachstumsannahme  $\rho_f < \rho$  ergibt andererseits

$$\log |f(Re^{i\theta})| \leq \log (A \exp(BR^\rho)) \in CR^\rho, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

für genügend großes  $R \geq R_0 \geq 2$ . Mit  $R = 2r$  folgt

$$n(r) \leq Cr^\rho, \quad r \geq r_0 \geq 1.$$



ii) Da es wegen Kor. 3.4.2 höchstens endlich viele Nullstellen  $z_k$  mit  $|z_k| \leq 1$  gibt, genügt es,  $\sum_{|z_k| \geq 1} |z_k|^{-s}$  abzuschätzen. Dies gelingt mit i) mittels dyadischer Zerlegung

$$\sum_{|z_k| \geq 1} |z_k|^{-s} = \sum_{j=0}^{\infty} \left( \sum_{2^j \leq |z_k| < 2^{j+1}} |z_k|^{-s} \right)$$

$$\leq \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-sj} \underbrace{n(2^{j+1})}_{\leq C 2^{(j+1)\rho}} \leq C \sum_{j=0}^{\infty} 2^{(p-s)j} < \infty,$$

da  $2^{p-s} < 1$  für  $s > p$ . □

Beisp. 5.3.2. Die ganze Funktion

$$f(z) = \sin(\pi z) = \frac{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}}{2i}, \quad z \in \mathbb{C},$$

hat Ordnung  $\rho_f = 1$  und einfache Nullstellen genau bei  $z_k = k, k \in \mathbb{Z}$ .

Da  $\sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} |z_k|^{-s} = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{1}{|k|^s} < \infty$

genau dann gilt, wenn  $s > 1$ , sieht man, daß die Aussage von Satz 5.3.3. ii) nicht verbessert werden kann.

Eine erste Anwendung des Begriffs der Ordnung des Wachstums einer ganzen Funktion  $f$  ist die folgende Verallgemeinerung des Maximumprinzips für gewisse unbeschränkte Gebiete.

Satz 5.3.4 (Phragmén-Lindelöf)

Sei  $S = \{z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}; r > 0, |\theta| < \frac{\pi}{4}\}$ ,

und sei  $f \in C^0(\bar{S}; \mathbb{C})$  holomorph in  $S$  mit  $\rho_f \leq 1$  und mit

$$|f(z)| \leq 1, \quad z \in \partial S.$$

Dann gilt  $|f(z)| \leq 1$  für jedes  $z \in S$ .

Bem. 5.3.1. Die Bedingung  $\rho_f \leq 1$  ist notwendig, wie das Beispiel der Funktion

$f(z) = e^{z^2}$ ,  $z \in \mathbb{C}$ , zeigt. Es gilt

$$z^2 = r^2 e^{\pm i \frac{\pi}{2}} = \pm i r^2 \quad \text{für } z = r e^{\pm i \frac{\pi}{4}} \in \partial S;$$

also  $|f(z)| = 1$  für  $z \in \partial S$ ; jedoch gilt

$$e^{x^2} \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow \infty, x \in \mathbb{R}).$$

Siehe auch Übung

Bew. von Satz 5.3.4: Fixiere  $1 < \alpha < 2$   
 und für  $0 < \varepsilon < 1$  betrachte die Funktion

$$f_\varepsilon(z) = f(z) e^{-\varepsilon z^\alpha}, \quad z \in \overline{S},$$

wobei  $z^\alpha = \exp(\alpha \log(z))$  wie oben definiert  
 mit dem Hauptzweig des Logarithmus.

Für  $z = r e^{i\theta}$ ,  $|\theta| \leq \pi/4$ , gilt dann

$$\operatorname{Re}(z^\alpha) = r^\alpha \cos(\alpha\theta) \geq r^\alpha \cos(\alpha\pi/4).$$

mit  $\cos(\alpha\pi/4) =: \beta > 0$ . Da  $\rho_f \leq 1$  folgt  
 mit Konstanten  $A, B > 0$  für  $z \in S$ :

$$|f_\varepsilon(z)| \leq |f(z)| e^{-\varepsilon\beta|z|^\alpha} \leq A e^{B|z|^{\frac{1+\alpha}{2}} - \varepsilon\beta|z|^\alpha} \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0,$$

und es existiert  $0 < R_\varepsilon \rightarrow \infty$  ( $\varepsilon \downarrow 0$ ) mit

$$|f_\varepsilon(z)| \leq 1 \quad \text{für } z \in \partial(S \cap B_{R_\varepsilon}(0)).$$

Da  $f_\varepsilon \in C^0(\overline{S \cap B_{R_\varepsilon}(0)})$  holomorph in  $S'$ ,  
 ergibt das Maximumprinzip für jedes  $z_0 \in S$

$$1 \geq \sup_{z \in \partial(S \cap B_{R_\varepsilon}(0))} |f_\varepsilon(z)| \geq |f_\varepsilon(z_0)| = |f(z_0)| e^{-\varepsilon|z_0|^\alpha},$$

falls  $\varepsilon > 0$  genügend klein, so daß  $|z_0| < R_\varepsilon$ . Da  
 $z_0 \in S$  beliebig, folgt mit  $\varepsilon \downarrow 0$  die Behauptung.  $\square$

Pause Funktionen mit vorgegebenen Nullstellen kann man z.B. durch Produktdarstellungen gewinnen.

Def. 5.3.2. Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ . Das unendliche Produkt

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$$

konvergiert, falls  $\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N (1+a_n) =: A$  existiert, und  $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n) =: A$ .<sup>1)</sup>

Lemma 5.3.3. Es gelte  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ .

Dann konvergiert das Produkt  $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ , und

$$A := \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$$

ist unabhängig von der Reihenfolge der Faktoren. Weiter ist  $A = 0$  gdw.  $1+a_{n_0} = 0$  für ein  $n_0 \in \mathbb{N}$ .

Bew.: Mit  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$  folgt die Existenz von  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit

$$\forall n \geq n_0 : |a_n| < \frac{1}{2}.$$

<sup>1)</sup> Vgl. Shakarchi-Stein, S. 140.

i) Zunächst wollen wir annehmen  $a_0 = 1$ ,  
 und der Hauptzweig des Logarithmus  
 ist für alle Terme  $1+a_n$  definiert mit

$$1+a_n = \exp\left(\log(1+a_n)\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Für  $N \in \mathbb{N}$  folgt

$$\prod_{n=1}^N (1+a_n) = \exp\left(\sum_{n=1}^N \log(1+a_n)\right),$$

wobei

$$\begin{aligned} \log(1+a_n) &= a_n - \frac{a_n^2}{2} + \frac{a_n^3}{3} - \dots \\ &= - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^k}{k}; \end{aligned}$$

also für  $|a_n| \leq \frac{1}{2}$

$$|\log(1+a_n)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_n|^k = \frac{|a_n|}{1-|a_n|} \leq 2|a_n|,$$

Mit  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$  folgt somit, daß die Reihe

$$B := \sum_{n=1}^{\infty} \log(1+a_n)$$

absolut konvergiert, unabhängig von der Summationsreihen-  
 folge, und  $\prod_{n=1}^N (1+a_n) \xrightarrow{(N \rightarrow \infty)} e =: \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n).$

Inbesondere ist  $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n) = e^B \neq 0$ .

ii) Falls allgemein  $n_0 \in \mathbb{N}$ , so existiert weiterhin  $\prod_{n=n_0}^{\infty} (1+a_n) =: A_0$  und damit

auch

$$A = \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n) = A_0 \prod_{n=1}^{n_0-1} (1+a_n),$$

und

$$A = 0 \Leftrightarrow \exists 1 \leq u \leq n_0 : 1+a_u = 0.$$

□

Satz 5.3.5. Sei  $\Omega \subset \mathbb{C}$  offen,

$f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph mit

$$\forall z \in \Omega : |f_n(z) - 1| \leq c_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

für  $c_n > 0$  mit  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n < \infty$ . Dann

konvergiert  $F(z) = \prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  unabhängig von der Reihenfolge der Faktoren, und

$F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  ist holomorph.

Zudem gilt für  $z \in \Omega$  mit  $f_n(z) \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n'(z)}{f_n(z)}.$$

Bew.: i) Schreibe  $f_n(z) = 1 + a_n(z)$

mit  $|a_n(z)| \leq c_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $z \in \Omega$ .

Wähle  $n_0 \in \mathbb{N}$  mit  $\sum_{n \geq n_0} c_n \leq \frac{1}{2}$ ,

und für  $N \geq L \geq n_0$  schreibe  $F_N(z) = \prod_{n=1}^N f_n(z)$ ,

$$F_N(z) - F_L(z) = \left( \prod_{n=L+1}^N f_n(z) - 1 \right) F_L(z).$$

Genäß Lemma 5.3.3 existiert

$$F(z) = \lim_{L \rightarrow \infty} F_L(z), \quad z \in \Omega,$$

und

$$|F(z)|, |F_L(z)| \leq \prod_{n=1}^{n_0} (1 + c_n) \exp\left(2 \sum_{n=n_0+1}^{\infty} c_n\right) =: C_0,$$

gleichmäßig in  $z \in \Omega$ ,  $L \in \mathbb{N}$ ; zudem ist  $F$  unabhängig von der Reihenfolge der Faktoren.

Weiter gilt analog zum Beweis von Lemma 5.3.3

$$|\overline{F}_N(z) - \overline{F}_L(z)| \leq C_0 \left| \prod_{n=L+1}^N f_n(z) - 1 \right|$$

$$= C_0 \left| \prod_{n=L+1}^N (1 + a_n(z)) - 1 \right|$$

$$= C_0 \left| \exp\left(\sum_{n=L+1}^N \log(1 + a_n(z))\right) - 1 \right|$$

$$\leq C_0 \left| \exp\left(2 \underbrace{\sum_{n=L+1}^N c_n}_{\leq 1}\right) - 1 \right|$$

(Mittelwertsatz)

$$\leq 2e C_0 \sum_{n>L} c_n \rightarrow 0 \quad (N \geq L \rightarrow \infty),$$

gleichmäßig in  $z \in \Omega$ .

Nach Kor. 3.4.6 von Weierstrass ist  $\overline{F}$  holomorph in  $\Omega$ , und  $\overline{F}_N \xrightarrow{(N \rightarrow \infty)} \overline{F}'$  lokal glm.

ii) Falls für ein  $z_0 \in \Omega$  gilt  $f_n(z_0) \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , so ergibt Stetigkeit von  $f_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , zusammen mit  $|f_n - 1| \leq c_n < \frac{1}{2}$  für  $n \geq n_0$ , daß für ein  $R > 0$  mit  $\overline{B}_R(z_0) \subset \Omega$  und ein  $c > 0$  gilt



$|f_n(z)| \geq c > 0$  für alle  $z \in \overline{B_R(z_0)}$ . Mit Lemma 5.3.3 folgt dann auch  $\overline{F}(z) \neq 0, z \in \overline{B_R(z_0)}$ .

Lokal gleichmäßige Konvergenz

$\overline{F}_N \rightarrow \overline{F}, \overline{F}'_N \rightarrow \overline{F}'$  ( $N \rightarrow \infty$ ) ergibt mit Stetigkeit von  $\overline{F}$  dann auch  $|\overline{F}(z)| \geq c_1 > 0, z \in \overline{B_R(z_0)}$ , und

$$\frac{\overline{F}'_N(z)}{\overline{F}_N(z)} = \sum_{n=1}^N \frac{f'_n(z)}{f_n(z)} \xrightarrow{(N \rightarrow \infty)} \frac{\overline{F}'(z)}{\overline{F}(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)}$$

lokal gleichmäßig in  $B_R(z_0)$ .

Beachte, daß mit

$$|f_n(z)| \geq c > 0 \text{ in } \overline{B_R(z_0)}$$

und der Abschätzung für jedes  $0 < r < R$

$$|f'_n(z)| = |(f_n^{-1})'(z)| \leq \frac{\max_{\overline{B_r(z_0)}} |f_n^{-1}|}{R-r} \leq \frac{c_n}{R-r}, \quad z \in B_r(z_0),$$

gemäß der Cauchy-Ungleichung, (Bem. 3.4.1.i), auch die Reihe

$$\frac{\overline{F}'(z)}{\overline{F}(z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)}, \quad z \in B_R(z_0),$$

lokal gleichmäßig absolut konvergiert.  $\square$

Beisp. 5.3.3. Wir zeigen Eulers  
Produktformel

$$\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \prod_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right), \quad z \in \mathbb{C}.$$

Beachte, daß für jedes  $z \in \mathbb{C}$  für  $f_n(z) = 1 - \frac{z^2}{n^2}$   
gilt  $|f_n(z) - 1| \leq c_n = \frac{|z|^2}{n^2}$ ,  $\sum_{n \neq 0} c_n < \infty$ .

Den Beweis führen wir in 3 Schritten.

Beh. 1. Die Funktion  $\cot = \frac{\cos}{\sin}$  erfüllt

$$-\pi \frac{d}{dz} \cot(\pi z) = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}, \quad z \notin \mathbb{Z}.$$

Bew.: Die Funktion

$$g(z) := \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} - \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}, \quad z \notin \mathbb{Z},$$

hat wegen

$$(z-n)g(z) = \frac{\pi^2(z-n)^3 - (z-n)\left(\pi(z-n) + O((z-n)^3)\right)^2}{\sin^2(\pi(z-n))(z-n)^2} + O(z-n)$$

$$= O(z-n) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow n, n \in \mathbb{Z})$$

hebbare Singularitäten bei  $z \in \mathbb{Z}$ .

Zudem gilt  $g(z) = g(z+1)$ ,  $z \in \mathbb{C}$ ,  
und  $|g(z)| \leq C$  für  $|\operatorname{Im}(z)| \leq 1$ .

Weiter gilt für  $|\operatorname{Im}(z)| \rightarrow \infty$  sowohl

$$\left| \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2} \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z-n|^2} \leq \sum_{n > |z|} \frac{1}{n^2} + \frac{2|z|}{|\operatorname{Im} z|} \xrightarrow{z \rightarrow 0} 0$$

als auch

$$|\sin(\pi z)| = \left| \frac{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}}{2i} \right| \rightarrow \infty ;$$

also  $|g(z)| \leq C$ , gleichmäßig in  $z \in \mathbb{C}$ .

Mit Kor. 3.4.4 (Liouville) folgt

$$g \equiv \text{const.} = \lim_{|\operatorname{Im}(z)| \rightarrow \infty} g(z) = 0.$$

□

Beh. 2: Für  $z \notin \mathbb{Z}$  gilt

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right).$$

Beachte dabei, daß

$$\left| \frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right| = \left| \frac{z}{n(z-n)} \right| \leq \frac{2|z|}{n^2}, \quad |n| \geq 2|z|,$$

so daß die Summe absolut konvergiert für  $z \notin \mathbb{Z}$ .  
Folglich können wir die Summe umordnen und erhalten

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right) + \left( \frac{1}{z+n} + \frac{1}{-n} \right) \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}, \quad z \notin \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Bew. von Beh. 2: Gemäß Beh. 1 gilt

für

$$h(z) := \pi \cot(\pi z) - \left( \frac{1}{z} + \sum_{n \neq 0} \left( \frac{1}{z-n} + \frac{1}{n} \right) \right)$$

die Gleichung

$$\frac{d}{dz} h(z) = \pi \frac{d}{dz} \cot(\pi z) + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2} = 0;$$

also wegen  $h(z) = -h(-z)$ ,  $z \notin \mathbb{Z}$ ,  $h(z) \equiv \text{const.} = 0$ . □

Betrachte nun

$$G(z) = \frac{\sin(\pi z)}{\pi}, \quad P(z) = z \prod_{n \neq 0} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right), \quad z \in \mathbb{C},$$

mit

$$\frac{G'(z)}{G(z)} = \pi \frac{\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)} = \pi \cot(\pi z), \quad z \notin \mathbb{Z},$$

und

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z} - \sum_{n \neq 0} \frac{2z}{n^2 \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)}$$

$$= \frac{1}{z} + \sum_{n \neq 0} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \pi \cot(\pi z) = \frac{G'(z)}{G(z)}, \quad z \notin \mathbb{Z}.$$

Es folgt für  $z \notin \mathbb{Z}$  die Gleichung

$$\left(\frac{P(z)}{G(z)}\right)' = \frac{P'(z)G(z) - G'(z)P(z)}{G(z)^2} = \frac{P(z) \left(\frac{P'(z)}{P(z)} - \frac{G'(z)}{G(z)}\right)}{G(z)^2} = 0,$$

und  $P(z) = c G(z)$

mit

$$c = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{P(z)}{G(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\pi z}{\sin(\pi z)} = 1.$$

Ohne Beweis geben wir noch die folgende Darstellung ganzer Funktionen analog zur Zerlegung von Polynomen in Linearfaktoren an.

Def. 5.3.3. Für  $k \in \mathbb{N}$  heißt

$$\bar{E}_k(z) = (1-z) e^{z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^k}{k}}, \quad z \in \mathbb{C},$$

der kanonische Faktor vom Grad  $k$ . Setze weiter

$$\bar{E}_0(z) = 1 - z.$$

Satz 5.3.6 (Hadamard) Sei  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph mit  $\rho_f < \infty$ ,  $k \in \mathbb{N}_0$  mit  $k \leq \rho_f < k+1$ .

Seien  $z_1, z_2, \dots$  die Nullstellen  $z_n \neq 0$  von  $f$ .

Dann gibt es ein Polynom  $p$  vom Grad  $\leq k$ , so daß

$$f(z) = e^{p(z)} z^m \prod_{n=1}^{\infty} \bar{E}_k\left(\frac{z}{z_n}\right), \quad z \in \mathbb{C},$$

wobei  $m \in \mathbb{N}$  die Ordnung der Nullstelle  $z_0 = 0$ , falls  $f(0) = 0$ , und  $m = 0$  falls  $f(0) \neq 0$ .

Bew.: Siehe z.B. Shakarchi-Stein, S. 147 ff.

## 5.4 Die Gamma-Funktion

Für  $s > 0$  gilt gemäß der klassischen Definition

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt. \quad (5.4.1)$$

Indem wir allgemein  $t^s = \exp(s \cdot \log t)$  setzen, können wir  $\Gamma$  holomorph auf die rechte Halbebene erweitern.

Satz 5.4.1. Durch (5.4.1) wird eine holomorphe Funktion  $\Gamma$  für  $\operatorname{Re}(s) > 0$  erklärt.

Bew.: Schreibe  $\Gamma(s) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \Gamma_{\varepsilon}(s)$  mit

$$\Gamma_{\varepsilon}(s) = \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{s-1} dt, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

Da  $s \mapsto t^s = \exp(s \log t)$  holomorph, ist  $\Gamma_{\varepsilon}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  für jedes  $\varepsilon > 0$  ebenfalls holomorph.

Mit  $|e^{-t} t^{s-1}| = e^{-t} t^{\operatorname{Re}(s)-1}$ ,  $t > 0$

folgt zudem lokal gleichmäßige Konvergenz

$$\Gamma_{\varepsilon}(s) \rightarrow \Gamma \quad (\varepsilon \downarrow 0)$$

für  $\operatorname{Re}(s) > 0$ . Mit Kor. 3.4.6 erhalten wir auch Konvergenz in  $C^1_{\text{loc}}$ , und  $\Gamma$  ist holomorph in  $\{s \in \mathbb{C}; \operatorname{Re}(s) > 0\}$ .  $\square$

Wir können  $\Gamma$  zu einer meromorphen Funktion  
 $\Gamma: \mathbb{C} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  fortsetzen mit Hilfe der folgenden  
Beobachtung,

Lemma 5.4.1. Für  $\operatorname{Re}(s) > 0$  gilt

$$\Gamma(s+1) = s \Gamma(s);$$

insbesondere erhalten wir so  $\Gamma(n+1) = n!$  für  $n \in \mathbb{N}_0$ .

Bew.: Für  $\varepsilon > 0$  integriere partiell

$$\int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^s dt = \left( e^{-t} t^s \right) \Big|_{t=\varepsilon}^{1/\varepsilon} + s \int_{\varepsilon}^{1/\varepsilon} e^{-t} t^{s-1} dt,$$

Grenzübergang  $\varepsilon \downarrow 0$  ergibt die behauptete  
Identität.

Mit

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$$

erhalten wir daraus auch für  $n \in \mathbb{N}$  die Identität

$$\Gamma(n+1) = n \Gamma(n) = \dots = n! \Gamma(1) = n!$$

□



Motiviert durch Lemma 5.4.1 definieren wir

$$\bar{F}_1(s) := \frac{\Gamma(s+1)}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > -1.$$

Dann ist  $\bar{F}_1$  eine in der Halbebene  $\operatorname{Re}(s) > -1$  meromorphe Funktion mit einem einfachen Pol bei  $s=0$  und

$$\operatorname{res}_{s=0} \bar{F}_1 = \lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ s \neq 0}} s \bar{F}_1(s) = \Gamma(1) = 1.$$

Da zudem für  $\operatorname{Re}(s) > 0$  gilt  $\bar{F}_1(s) = \Gamma(s)$ , können wir  $\Gamma$  durch  $\bar{F}_1$  für  $\operatorname{Re}(s) > -1$  meromorph fortsetzen.

Iterieren wir dieses Verfahren, so erhalten wir die meromorphe Funktion

$$\bar{F}_2(s) = \frac{\bar{F}_1(s+1)}{s} = \frac{\Gamma(s+2)}{(s+1)s}, \quad \operatorname{Re}(s) > -2,$$

mit einfachen Polstellen bei  $s=0$  und  $s=-1$ ,  
und allgemein für  $m \in \mathbb{N}$  die Funktion

$$\bar{F}_m(s) = \frac{\bar{F}_{m-1}(s+1)}{s} = \dots = \frac{\Gamma(s+m)}{(s+m-1)(s+m-2)\dots s}, \quad \operatorname{Re}(s) > -m,$$

mit einfachen Polstellen bei  $s=0, -1, \dots, 1-m$ ,  
welche  $\Gamma$  meromorph auf die Halbebene  $\operatorname{Re}(s) > -m$

fortgesetzt, mit Residuen

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{s=-k} \bar{\Gamma}_m &= \lim_{\substack{s \rightarrow -k \\ s \neq -k}} (s+k) \frac{\Gamma(s+m)}{(s+m-1) \cdots s} \\ &= \frac{\Gamma(m-k)}{(m-k-1)! (-1)(-2) \cdots (-k)} = \frac{(-1)^k}{k!}, \quad 1 \leq k < m. \end{aligned}$$

Im allgemeinen kann man  $\Gamma(s)$  für  $s \notin \mathbb{N}$  nicht explizit bestimmen. Der folgende Satz erlaubt jedoch die Berechnung von  $\Gamma(\frac{1}{2})$ .

Satz 5.4.2. Es gilt für jedes  $s \in \mathbb{C}$  die Identität

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \in \overline{\mathbb{C}}.$$

Kor. 5.4.1. Es gilt  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ .

Bew.:  $\Gamma(\frac{1}{2}) > 0$  erfüllt  $(\Gamma(\frac{1}{2}))^2 = \frac{\pi}{\sin(\frac{\pi}{2})} = \pi$  nach

Satz 5.4.2. □

Für den Beweis von Satz 5.4.2 benötigen wir ein Lemma.

Lemma 5.4.2. Für  $0 < a < 1$  gilt

$$\int_0^{\infty} \frac{r^{a-1}}{1+r} dr = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}$$

Bew.: Substituieren wir  $r = e^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , erhalten

wir

$$\int_0^{\infty} \frac{r^a}{1+r} \frac{dr}{r} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}$$

gemäß Beisp. 4.1.3. □

Bew. von Satz 5.4.2: Da  $\Gamma(s)$  einfache Pole bei  $s = 0, -1, -2, \dots$  besitzt und  $\Gamma(1-s)$  einfache Pole bei  $s \in \mathbb{N}$ , besitzt ihr Produkt  $\Gamma(s)\Gamma(1-s)$  ebenso wie  $\frac{\pi}{\sin(\pi s)}$  einen einfachen Pol bei jedem  $s \in \mathbb{Z}$  und ist holomorph auf  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ .

Wegen der Eindeutigkeit der holomorphen Fortsetzung genügt es daher, die Aussage für  $0 < s < 1$  zu zeigen.

Beachte zunächst, daß für  $0 < s < 1$  gilt

$$\Gamma(1-s) = \int_0^{\infty} e^{-z} z^{-s} dz \stackrel{(z=rt)}{=} t \int_0^{\infty} e^{-rt} (rt)^{-s} dt,$$

wobei  $t > 0$  beliebig.

Durch Vertauschen der Integrationsreihenfolge mit dem Satz von Fubini erhalten wir dann

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} \Gamma(1-s) dt$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} \left( t \int_0^{\infty} e^{-rt} (rt)^{-s} dt \right) dt$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(1+r)t} r^{-s} dt dr$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{r^{-s}}{1+r} dr \stackrel{(-s=a-1)}{=} \frac{\pi}{\sin(\pi(1-s))} = \frac{\pi}{\sin(\pi s)},$$

wobei wir im letzten Schritt Lemma 5.4.2 benutzen und beachten, daß mit  $0 < s < 1$  auch gilt  $0 < a = 1-s < 1$ .

□

## 5.5 Die Riemannsche Zeta-Funktion

Für reelles  $s > 1$  konvergiert die Reihe

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Wegen

$$|n^s| = |\exp(s \log(n))|$$

$$= \exp(\operatorname{Re}(s) \log(n)) = n^{\operatorname{Re}(s)}$$

konvergiert  $\zeta(s)$  auch für  $s \in \mathbb{C}$  mit  $\operatorname{Re}(s) > 1$ ,  
und  $s \mapsto \zeta(s)$  ist holomorph in  $\{s \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(s) > 1\}$ .

Der folgende Satz zeigt eine enge Verbindung  
zwischen der  $\zeta$ -Funktion und den Primzahlen.

Satz 5.5.1 (Euler) Für  $\operatorname{Re}(s) > 1$  gilt

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prim}} \frac{1}{1 - (1/p)^s}.$$

Bew.: Es genügt, die Identität für reelle  $s > 1$   
zu zeigen. Die Aussage für alle  $s \in \mathbb{C}$  mit  
 $\operatorname{Re}(s) > 1$  folgt dann aus der Analytizität der  
beiden Funktionsausdrücke.

Beachte, daß für jede Primzahl  $p > 1$   
und für jedes  $s > 1$  gilt

$$\frac{1}{1 - (1/p)^s} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{p}\right)^{sm}.$$

Weiter besitzt jedes  $n \in \mathbb{N}$  gemäß dem  
Hauptsatz der Arithmetik eine eindeutige  
Produktzerlegung

$$n = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k},$$

wo  $p_k$  prim,  $s_k \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq k \leq k$ .

Für jedes  $N = 2^M \in \mathbb{N}$  erhalten wir so  
die Abschätzung

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} \leq \prod_{\substack{p \leq N \\ p \text{ prim}}} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \dots + \frac{1}{p^{sM}}\right)$$

$$\leq \prod_{\substack{p \leq N \\ p \text{ prim}}} \left(\frac{1}{1 - (1/p)^s}\right) \leq \prod_{p \text{ prim}} \left(\frac{1}{1 - (1/p)^s}\right),$$

und Grenzübergang  $N \rightarrow \infty$  ergibt

$$\zeta(s) \leq \prod_{p \text{ prim}} \left(\frac{1}{1 - (1/p)^s}\right).$$

Umgekehrt gilt für jedes Paar  $M, N \in \mathbb{N}$   
die Abschätzung

$$\prod_{\substack{p \leq N \\ p \text{ prim}}} \left( 1 + \frac{1}{p^s} + \dots + \frac{1}{p^{sM}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \zeta(s).$$

Nach Grenzübergang  $M \rightarrow \infty$  folgt

$$\prod_{\substack{p \leq N \\ p \text{ prim}}} \left( \frac{1}{1 - (1/p)^s} \right) \leq \zeta(s).$$

Grenzübergang  $N \rightarrow \infty$  schließlich ergibt

$$\prod_{p \text{ prim}} \left( \frac{1}{1 - (1/p)^s} \right) \leq \zeta(s)$$

und damit die Behauptung.

□

"Ähnlich zum Verfahren zur Fortsetzung von  $\Gamma$  kann man auch  $\zeta$  zu einer meromorphen Funktion auf  $\mathbb{C}$  fortsetzen.

Analog zu Satz 5.4.2 gilt dann die fundamentale Beziehung

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s), \quad s \in \mathbb{C};$$

vgl. Salamon (4.69).

Für  $s \in \mathbb{C}$  mit  $\operatorname{Re}(s) < 0$  gilt:

i)  $\operatorname{Re}(1-s) > 1$ ; also  $\zeta(s) = \prod_{p \text{ prim}} \left( \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{p}\right)^s} \right) \neq 0$   
gemäß Lemma 5.3.3;

ii)  $\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s) \Gamma(s)} \neq 0$ ,

da  $\Gamma(s) \cdot \sin(\pi s)$  für  $\operatorname{Re}(s) < 1$  nur hebbare Singularitäten bei  $s \in -\mathbb{N}_0$  besitzt;

iii)  $\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) = 0$  gdw.  $s/2 \in -\mathbb{N}$ .

Also gilt  $\zeta(s) \neq 0$  für  $\operatorname{Re}(s) < 0$  außer an den "trivialen" Nullstellen  $s \in -2\mathbb{N}$ , und  $\zeta(s) \neq 0$  für  $\operatorname{Re}(s) > 1$  nach Lemma 5.3.3.



Folge: Außer den "trivialen" Nullstellen  $s \in -2\mathbb{N}_0$  liegen alle Nullstellen von  $\zeta$  im "kritischen Streifen"  $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ .

Riemannsche Vermutung. Alle Nullstellen  $s$  von  $\zeta$  mit  $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$  haben  $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ .

Bem. 5.5.1, Hadamard hat gezeigt, daß  $\zeta(s) \neq 0$  für  $s \in \mathbb{C}$  mit  $\operatorname{Re}(s) = 1$ , und damit bewiesen, daß gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1,$$

wobei

$$\pi(x) = \#\{p \in \mathbb{N}; p \text{ prim}, p \leq x\}.$$