


# I. Numerische Quadratur

Ziel: - approximieren von bestimmten Integralen

$$Q[f] \approx \int_a^b f(x) dx$$

- Genauigkeit der Approximation abschätzen
- fundamentale Konzepte der Numerik kennenlernen
- Newton-Cotes, Gauss, adaptive Quadratur
- zwei-dimensionale Quadratur

Wozu: Oft ist  $\int_a^b f(x) dx$  nicht exakt berechenbar



$$I[f] = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_j w_j \cdot f(x_j) = Q[f]$$

## I.1 Polynomiale Interpolation

Gegeben  $n+1$  paarweise verschiedene Stützstellen / Knoten  $x_0, x_1, \dots, x_n$  und zu gehörige Stützwerte  $y_0, y_1, \dots, y_n$


finde das Polynom  $n$ -ten Grades

$$p_n(x) = a_0 + a_1 \cdot x + \dots + a_n \cdot x^n \in P_n$$

welches die Interpolationsbedingungen (IB) erfüllt

$$p_n(x_j) = y_j \quad (j=0,1,\dots,n)$$

Die  $n+1$  Koeffizienten  $a_0, a_1, \dots, a_n$  des sog. Interpolationspolynom (IP) ergeben sich aus den  $n+1$  IB (als lineares Gleichungssystem (LGS))



Bsp.: (1) Finde  $p_2(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2$

mit  $(x_0, y_0) = (1, 2)$ ,  $(x_1, y_1) = (3, 5)$  und

$(x_2, y_2) = (4, 4)$

Die IB lauten

$$p_2(x_0) = p_2(1) = a_0 + a_1 + a_2 = 2 = y_0$$

$$p_2(x_1) = p_2(3) = a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 5 = y_1$$

$$p_2(x_2) = p_2(4) = a_0 + 4a_1 + 16a_2 = 4 = y_2$$

Oder als LGS

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Lösen ... } a_0 = -2, \quad a_1 = \frac{23}{6}, \quad a_2 = -\frac{5}{6}$$

MATLAB:  $- p = \text{polyfit}(x, y, n)$

↑ Stützstellen  
↑ Grad  
↑ Stützwerte

- Einfache Auswertung mit polyval

Das IP kann man auch direkt mittels der Lagrange'schen Interpolationsformel (LI) bestimmen

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot \hat{L}_j(x)$$

wobei

$$\hat{L}_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i} \quad (j=0, 1, \dots, n)$$

die sog. Lagrange-Polynome (LP) sind.

Die LP haben folgende Eigenschaften

(LP1)  $\hat{L}_j(x)$  sind Polynome  $n$ -ten Grades

$$(LP2) \hat{L}_j(x_k) = \delta_{jk} = \begin{cases} 1, & j=k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

(LP2) ist der Grund wieso LI die IB erfüllt:

$$p_n(x_i) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot \hat{L}_j(x_i)$$

$$= 0 + \dots + 0 + y_i \cdot \underbrace{\hat{L}_i(x_i)}_1 + 0 + \dots$$

$$= y_i \checkmark$$

5

Bsp.: (2) finde das IP durch  $(x_0, y_0) = (1, 2)$ ,  
 $(x_1, y_1) = (3, 5)$  und  $(x_2, y_2) = (4, 4)$

$\hookrightarrow$  wie Bsp. (1)!

Berechne die LP:

$$\begin{aligned} L_0^2(x) &= \frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_2} = \frac{x - 3}{1 - 3} \cdot \frac{x - 4}{1 - 4} \\ &= \frac{1}{6} (x - 3)(x - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_1^2(x) &= \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{x - 1}{3 - 1} \cdot \frac{x - 4}{3 - 4} \\ &= -\frac{1}{2} (x - 1)(x - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2^2(x) &= \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \cdot \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{x - 1}{4 - 1} \cdot \frac{x - 3}{4 - 3} \\ &= \frac{1}{3} (x - 1)(x - 3) \end{aligned}$$

Damit

$$\begin{aligned} p_2(x) &= 2 \cdot L_0^2(x) + 5 \cdot L_1^2(x) + 4 \cdot L_2^2(x) \\ &= \dots = -2 + \frac{29}{6}x - \frac{5}{6}x^2 \\ &\quad (\equiv \text{Bsp. (1) f.}) \end{aligned}$$

## I.2 Interpolationsfehler

Nun sollen die Stützpunkte  $y_j$  Werte einer Funktion  $f$  an den paarweise verschiedenen Stützstellen  $x_j$  sein und wir fragen uns wie gut das IP die Funktion  $f$  zwischen den Stützstellen approximiert.


Sei also  $f: I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  und wir bezeichnen mit

$$p[f|x_0, \dots, x_n](x) \in P_n$$

das IP welches die IB

$$p[f|x_0, \dots, x_n](x_j) = f(x_j) \quad (j=0, 1, \dots, n)$$

erfüllt.



Für  $f$   $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar lässt sich zeigen, dass es für jedes  $x \in I$  ein  $\varphi = \varphi(x) \in I$  gibt mit  
 ↗ hängt von  $x$  ab! (n+1)\text{-te Ableitung}

$$e(x) = f(x) - p[f|x_0, \dots, x_n](x) = \frac{f^{(n+1)}(\varphi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

↗ hängt von  $f$  ab den Stützstellen ab

$e(x)$  ist eine Fehlerfunktion über das ganze Intervall  $I$ . Off ist nur (nur) am größten Fehler über  $I$  interessiert:

$$\|e\|_\infty = \max_{x \in I} |e(x)| \quad (\text{Maximumsnorm})$$

$$= \max_{x \in I} \left| \frac{f^{(n+1)}(\varphi(x))}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) \right|$$

$$\leq \max_{x \in I} \left| \frac{f^{(n+1)}(\varphi(x))}{(n+1)!} \right| \cdot \max_{x \in I} \left| \prod_{j=0}^n (x - x_j) \right|$$


Abschätzung

$$= \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} \left\| \prod_{j=0}^n (x - x_j) \right\|_\infty$$

$\leq b-a$

$$\leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

Die letzte Abschätzung kann man am besten graphisch verstehen:



Die Aussage "für  $f$   $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar" werden wir noch oft sehen.

Man kann auch sagen: -  $f \in C^{n+1}[I]$

*weniger präzis ...*

$\left\{ \begin{array}{l} \text{- } f \text{ genügend glatt} \\ \text{ (smooth)} \\ \text{- } f \text{ genügend oft stetig} \\ \text{differenzierbar} \end{array} \right.$

## I.3 Numerische Integration = Quadrafur

Ziel: Approximation von

$$I[f] = \int_a^b f(x) dx$$

berechnen

Idee: Verwende Polynomiale Interpolation um  $f(x)$  zu approximieren und integriere

$$p[f | x_0, \dots, x_n]$$

(... Polynome sind einfach zu integrieren...)

Def.: Eine endliche Rechenvorschrift der Form

$$Q[f] = \sum_{j=0}^n w_j \cdot f(x_j)$$

zur Approx. von  $I[f]$  nennt man

Quadraturregel (QR) oder Quadraturregel.

Die  $x_j \in I = [a, b]$  nennt man (Quadratur)

Knoten oder Integrationsstützstellen und

die  $w_j$  (Quadratur) Gewichte.

Quadraturregeln können nur ganz einfach hergeleitet werden.

Seien  $x_0, x_1, \dots, x_n \in I$  uns gegebene Knoten.

Dann ist das IP einer Funktion  $f$

$$p[f(x_0, \dots, x_n)](x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot L_j^n(x)$$

Da das IP die Funktion approx., so gilt

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b p[f(x_0, \dots, x_n)](x) dx \\ &= \int_a^b \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot L_j^n(x) dx \\ &= \sum_{j=0}^n \int_a^b f(x_j) L_j^n(x) dx \\ &\quad \text{Konstant!} \\ &= \sum_{j=0}^n f(x_j) \underbrace{\int_a^b L_j^n(x) dx}_{\text{konstant}} \\ &= \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot w_j = Q_n[f] \end{aligned}$$

Die Quadratur Gewichte können also ganz einfach berechnet werden:

$$w_j = \int_a^b L_j^\circ(x) dx$$

Beachte: Die  $w_j$  sind unabhängig von f!

D.h. für gegebene Knoten  $x_j$  kann man sie ein für alle  $\eta$  berechnen und tabellieren.


Wichtige Beispiele ...

Bsp.: (3) Mittelpunktsregel (MR) ( $n=0$ )

$$\text{Knoten: } x_0 = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{LP : } L_0^\circ(x) = 1$$

$$\text{Gewicht: } w_0 = \int_a^b L_0^\circ(x) dx = b-a$$



Damit

$$Q_0[f] = (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

#### (4) Trapezregel (TR) ( $n=1$ )

Knoten:  $x_0 = a$ ,  $x_1 = b$


$$LP : L_0^1(x) = \frac{x-b}{a-b}$$

$$\hat{L}_1^1(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

$$\begin{aligned} \text{Gewichte: } w_0 &= \int_a^b L_0^1(x) dx = \int_a^b \frac{x-b}{a-b} dx \\ &= \frac{b-a}{2} \end{aligned}$$

$$I = \frac{(x-b)^2}{2(a-b)} \Big|_a^b =$$

$$w_1 = \dots = \frac{b-a}{2}$$



Damit

$$Q_1[f] = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

(S) Simpson-Regel (SR) ( $n=2$ )

Knoten:  $x_0 = a$ ,  $x_1 = \frac{a+b}{2}$ ,  $x_2 = b$

$$\text{LP} : L_0^2(x) = \frac{x - \frac{a+b}{2}}{a - \frac{a+b}{2}} \cdot \frac{x - b}{a - b}$$


$$L_1^2(x) = \dots$$

$$L_2^2(x) = \dots$$

Gewicht:  $w_0 = \int_a^b L_0^2(x) dx = \dots = \frac{b-a}{6}$

$$w_1 = \dots = \frac{4(b-a)}{6}$$

$$w_2 = \dots = \frac{b-a}{6}$$



Damit

$$\Omega_2[f] = \frac{b-a}{6} \left( f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

Die NR, TR und SR sind sog.  
Newton-Cotes (NC) QRn.

Bei diesen QR verteilt man die Knoten  $x_j$  äquidistant über das Intervall  $I = [a, b]$

$$n=0: x_0 = \frac{a+b}{2}$$

$$n>0: x_j = a + \frac{b-a}{n} j \quad \text{für } j=0, 1, \dots, n$$

Bem.: (i) TR und SR gehören zu den  
 "populärsten" QR

(ii) NC QR mit  $n > 6$  werden numerisch  
 unbrauchbar (da negative Gewichte  $w_j$   
 auftreten)

## I.4 Quadraturfehler

Nun interessieren wir uns für die Güte von QRn.

Def.: Wir nennen  $E[f] = |Q[f] - I[f]|$   
 den Quadraturfehler (QF).

Im Prinzip könnten wir den QF mit Hilfe des Interpolationsfehler untersuchen... Dies ist jedoch (relativ) "mühsam".

Als ein Maß der Genauigkeit einer QR definieren wir:

Def.: Eine QR hat Genauigkeitsgrad (GG)  $q \in \mathbb{N}$ , falls sie alle Polynome bis und mit zum Grad  $q$  exakt integriert und  $q$  die größtmögliche Zahl mit dieser Eigenschaft ist.

Manchmal auch Exaktheitsgrad.

Def.: Die Ordnung  $s$  einer QR ist definiert durch  $s = q + 1$ .

Dank der Linearität von  $I[f]$  und  $Q[f]$  kann man den GG einfach bestimmen durch

$$Q[x^k] = I[x^k] \quad k = 0, 1, \dots, q$$

$$Q[x^{q+1}] \neq I[x^{q+1}]$$

$$\begin{aligned} p \in P_q : \quad I[p] &= \int_a^b a_0 + a_1 \cdot x + \dots + a_q \cdot x^q dx \\ &= a_0 \int_a^b 1 dx + a_1 \int_a^b x dx + \dots + a_q \int_a^b x^q dx \end{aligned}$$

$$= a_0 \cdot I[1] + a_1 \cdot I[x] + \dots + a_q \cdot I[x^q]$$

$Q[p] = \dots \sim$  gleich wie für  $I[p]$

✓

Eine weitere willkommene Vereinfachung bei der Bestimmung des GG ist, dass man es nur für das Referenz-Intervall (RI)  $I = [-1, 1]$  überprüfen muss. Wieso?

Weil sich jedes Intervall  $[a, b]$  durch die Variablenubstitution

$$x = \frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2}, \quad t \in [-1, 1]$$

in das RI transformieren lässt:

$$\begin{aligned} I[f] &= \int_a^b f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) \underbrace{\frac{b-a}{2}}_dx dt \\ &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt \end{aligned}$$

Es ist klar, dass NCs QR<sub>n</sub> mindestens den GG des zugrundeliegenden IPs haben.

Falls der Grad  $\alpha$  des IPs aber gerade ist, so nennt man einen GG gratis dazu aus Symmetriegründen:

Bsp.: (6) MR ( $\alpha=0$ , also gerade)

$$Q_0[f] = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$Q_0[1] = 2 \cdot 1 = I[1]$$

$$Q_0[x] = 2 \cdot 0 = I[x]$$

$$Q_0[x^2] = 2 \cdot 0^2 \neq \frac{2}{3} = I[x^2]$$

$$\rightsquigarrow \text{GG } q=\lambda = n+1$$

(\*) TR ( $\alpha=1$ , also ungerade)

$$Q_1[f] = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

$$Q_1[1] = \frac{2}{2} \cdot (1 + 1) = 2 = I[1]$$

$$Q_1[x] = \frac{2}{2} ((-1) + 1) = 0 = I[x]$$

$$Q_1[x^2] = \frac{2}{2} ((-1)^2 + 1^2) = 2 \neq I[x^2]$$

$\rightsquigarrow G_G \quad q=1 = n$

(8) SR ( $n=2$ , also gerade)

$$Q_2[f] = \frac{b-a}{6} \left( f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

$$Q_1[1] = \dots$$

⋮      Übung

$$Q_n[x^k] = \dots$$

$\rightsquigarrow G_G \quad q=3 = n+1$

für den QF lässt sich zeigen

$$E[f] \leq \frac{\|f^{(q+1)}\|_{\infty}}{(q+1)!} (b-a)^{q+2} \quad \begin{matrix} s \\ \text{G_G} \end{matrix} \quad \begin{matrix} s+1 \\ -\text{Ordnung} \end{matrix} \quad (\text{QFA})$$


Bsp.: (3)  $\rightsquigarrow$  Slides

Zusammengefasst: Je größer der  $G_G$ , desto  
genauer ist eine QR,  
vorausgesetzt, das IP ist eine  
gute Approx. der Funktion  $f$

## I.5 Summierte Quadraturregeln

Um bessere Approximationen von  $I[f]$  zu erhalten benutzt man i.A. eine gegebene QR nicht über das gesamte Intervall  $[a,b]$ . Sondern man zerlegt  $[a,b]$  in eine Reihe kleinere Teil-Intervalle und verwendet die QR auf diese an und summiert die so erhaltenen Näherungen für die Teil-Integrale.

Die so erhaltenen Formeln nennt man summierte QR (SQR) oder zusammengesetzte QR.



TR auf jedem Teil-Intervall  
→ summierte TR (STR)

Das Intervall  $I = [a, b]$  wird in  $N$  Teil-Intervalle  $I_j = [x_{j-1}, x_j]$  ( $j=1, \dots, N$ ) verteilt mit

$$x_j = a + j \cdot h, \quad j=0, 1, \dots, N$$

und

$$h = \frac{b-a}{N}.$$

Nun verwendet man eine gegebene QR auf die Teil-Intervalle an und summierf

24.01.20

### Bsp.: (10) Summierte MR (SMR)

$$\begin{aligned} Q_0^N[f] &= \sum_{j=1}^N Q_0[f \text{ auf } I_j] \\ &= \sum_{j=1}^N h \cdot f\left(\frac{x_{j-1} + x_j}{2}\right) \end{aligned}$$

### (11) Summierte TR (STMR)

$$\begin{aligned} Q_1^N[f] &= \sum_{j=1}^N Q_1[f \text{ auf } I_j] \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{h}{2} \left( f(x_{j-1}) + f(x_j) \right) \\ &= \frac{h}{2} f(x_0) + h \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) + \frac{h}{2} f(x_N) \\ &= \frac{h}{2} \left( f(a) + 2 \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) + f(b) \right) \end{aligned}$$

(12) Summierte SR (SSR)

$$\begin{aligned}
 Q_2[f] &= \sum_{j=1}^N Q_2[f \text{ auf } I_j] \\
 &= \sum_{j=1}^N \frac{h}{6} \left( f(x_{j-1}) + 4 \cdot f\left(\frac{x_{j-1}+x_j}{2}\right) + f(x_j) \right) \\
 &= \frac{h}{6} \left[ f(a) + 2 \cdot \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) \right. \\
 &\quad \left. + 4 \cdot \sum_{j=1}^N f\left(\frac{x_{j-1}+x_j}{2}\right) + f(b) \right]
 \end{aligned}$$

Wie verhält sich der QF von  $SQR_n$ ?

Der QF einer SQR ist (offensichtlich) die Summe der gemachten Fehler auf jedem Teil-Intervall:

$$E^N[f] = | I[f] - Q_n^N[f] |$$

$$= \left| \sum_{j=1}^N I[f \text{ auf } I_j] - Q_n[f \text{ auf } I_j] \right|$$

$$\xleftarrow[\substack{\text{(Dreiecks)} \\ |a+b| \leq |a| + |b|}]{} \left| \sum_{j=1}^N \underbrace{|I[f \text{ auf } I_j] - Q_n[f \text{ auf } I_j]|}_{E[f \text{ auf } I_j]} \right|$$

$$(QFA) \leq \sum_{j=1}^N \frac{\max_{x \in I_j} |f^{(q+1)}(x)|}{(q+1)!} \underbrace{|x_j - x_{j-1}|}_{h}^{q+2}$$

$\infty$ -Norm über  $I = [a, b]$

$$\leq \frac{\|f^{(q+1)}\|_\infty}{(q+1)!} h^{q+1} \underbrace{\sum_{j=1}^N h}_{N \cdot h = b - a}$$

Zusammengefasst

$$\epsilon^N[f] \leq \frac{\|f^{(q+1)}\|_\infty}{(q+1)!} \cdot (b-a) \cdot h^{q+1} = \frac{\|f^{(s)}\|_\infty}{s!} \cdot (b-a) \cdot h^s$$

*GG*      *Ordnung*

Solche Abschätzung sind typisch und dazu verwendet man das Landau-Symbol.  
Man schreibt:

$$\epsilon = O(h^p)$$

Falls

$$|\epsilon| \leq C \cdot h^p$$

*C & p hängen nicht von h ab!*

für positive Konstanten C und p gilt

für alle  $h > 0$  klein genug.

für den SQR Fehler gilt also

$$\epsilon^N[f] = O(h^{q+s}) = O(h^s).$$

Bsp.: (13)  $\rightsquigarrow$  Slides

Bem.: (i) Die Ordnung  $s$  kann man sehr einfach in einem log-log plot ablesen

(ii) Um die volle Ordnung zu erhalten muss die zu integrierende Funktion gerisend glatt sein

## I.6 Gauss-Quadratur

Bei den NC QRn wählt man  $n+1$  äquidistant verteilte Knoten, legt das IP vom Grad  $n$  durch und erhält damit eine QR mit GG mindestens  $n$  ( $n/n+1$  falls  $n$  ungerade/gerade).

Idee: wähle die  $n+1$  Knoten so, dass der grösstmögliche GG erreicht wird  
 (Hoffnung: GG mit  $q \approx n + n + 1 = 2n + 1$ )

von IP  $\uparrow$  von den  $x_j$ 's  
 $n$ -ten Grades

Frage: Was ist der grösstmögliche GfG der man mit  $n+1$  Knoten erreichen könnte?

Betrachte folgendes Polynom vom Grad  $2n+2$  auf dem RI:

$$p(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2 \in P_{2n+2}$$

$\uparrow$   
Knoten

Klar:  $I[p] = \int_{-1}^1 p(x) dx > 0$

Aber mit Quadratur

$$Q[p] = \sum_{j=0}^n w_j \cdot p(x_j) = 0$$

$\underbrace{\phantom{w_j \cdot p(x_j)}}$   
0

Also der grösstmögliche GfG den man erreichen könnte ist  $q = 2n+1$ !

Diesen GfG kann man auch erreichen und man stossst dabei auf einen wichtigen Begriff der linearen Algebra:

Orthogonalität

Betrachten wir hierzu den Interpolationsfehler

$$e(x) = f(x) - p[f | x_0, \dots, x_n] = K(x) \cdot \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Sei nun  $f(x) = x^m$  ein Monom mit  $m > 0$  ganzzahlig. Dann ist

$$e(x) = x^m - p[x^m | x_0, \dots, x_n] = K(x) \cdot \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

↑                      ↑                      ↑  
 Polynom              Polynom              Polynom  
 Grad m              Grad n              Grad n+1  
 und                      und                      und  
 Polynom              Polynom              Polynom  
 Grad max{m-n-1, 0}

mit

$$K(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } m \leq n \\ r(x) \in P_{m-n-1} & \text{für } m > n \end{cases}$$

Integrieren wir nun  $e(x)$  über das RI:

$$\int_{-1}^1 e(x) dx = \int_{-1}^1 x^m dx - \int_{-1}^1 p[x^m | x_0, \dots, x_n] dx$$

$$= I[x^m] - Q[x^m]$$

$$= \int_{-1}^1 K(x) \cdot \prod_{i=0}^n (x-x_i) dx$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{für } m \leq n \\ \int_{-1}^1 r(x) \cdot \prod_{i=0}^n (x-x_i) dx & \text{für } m > n \end{cases}$$

Dies bestätigt uns noch einmal, dass eine QR mit  $n+1$  Knoten GCh von  $n$  hat.

Aber viel mehr noch: Wenn wir  $n+1$  Knoten mit

$$\int_{-1}^1 r(x) \cdot \prod_{i=0}^n (x-x_i) dx \stackrel{!}{=} 0$$

$\underbrace{\epsilon_P}_n \quad \underbrace{\epsilon_{P_{n+1}}}_{\in P_{n+1}}$

für  $n < m < 2n+1$  bestimmen können, so erhalten wir ein QR mit grösstmöglichen GCh!

Aus der linearen Algebra ist bekannt,

dass

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\lambda}^{\lambda} f(x) g(x) dx$$

Menge der stetigen Funktionen in  $C[-\lambda, \lambda]$

ein Skalarprodukt in  $C[-\lambda, \lambda]$  definiert.

Wenn  $\langle f, g \rangle = 0$ , so sind  $f$  und  $g$  orthogonal zueinander.

Also Polynome!

$$\langle r(x), \prod_{i=0}^n (x-x_i) \rangle = 0$$

sagt uns wir suchen Orthogonalfunktionen!

Dies führt uns zu den Legendre-Polynomen  
welche durch folgende Rekursionsformel  
gegeben sind

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x$$

$$P_{j+1}(x) = \frac{2j+1}{j+1} x \cdot P_j(x) - \frac{j}{j+1} P_{j-1}(x), \quad j \geq 1$$

$$, \{ j=0, 1, \dots, n \}$$

Die  $P_j(x)$  bilden eine orthonormale Basis von  $P_n$ :

$$\langle P_i(x), P_j(x) \rangle = \int_{-1}^1 P_i(x) \cdot P_j(x) dx = 0, \quad i \neq j$$

Um den maximalen GCR zu erhalten wählen wir die  $n+1$  Knoten so, dass

$$\prod_{i=0}^n (x - x_i) \sim P_{n+1}(x)$$

ein (skalares) Vielfaches vom  $(n+1)$ -ten Legendre-Polynom ist

☞ Wähle die Knoten  $x_i$  als die Nullstellen von  $P_{n+1}(x)$  !

## Gauss (-Legendre) Quadratur

Die  $(n+1)$ -Punkte Gauss-Legendre Quadratur (GLQ) auf dem RI  $[-1, 1]$  ist gegeben durch:

$$G_n[f] = \sum_{j=0}^n w_j \cdot f(x_j)$$

wobei die Gauss-Punkte  $x_j$  die Nullstellen des  $(n+1)$ -ten Legendre-Polynoms  $P_{n+1}(x)$  und die Gewichte

$$w_j = \frac{2(1-x_j^2)}{\left((n+1)P_n(x_j)\right)^2}, \quad j=0, 1, \dots, n$$

sind.

Sie hat den grösstmöglichen Grad  $q = 2n+1$  und damit Ordnung  $s = 2n+2$ .

Bsp.: (14) 2-Punkte GLQ ( $n=1$ )

① Berechne  $P_{n+1}(x) = P_2(x)$  mit  
Rekursionsformel

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

② Berechne Nullstellen von  $P_2(x)$

$$\frac{1}{2}(3x^2 - 1) = 0$$

$$x_{0,1} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

③ Berechne Gewichte

$$\begin{aligned} w_0 &= \frac{2(1 - x_0^2)}{(2 \cdot P_1(x_0))^2} = \frac{2(1 - 1/3)}{(2 \cdot (-1/\sqrt{3}))^2} \\ &= \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{1/3}}{\cancel{4} \cdot \frac{1}{3}} = 1 \end{aligned}$$

$$w_1 = 1$$

Also  $G_1[f] = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

- Bem.:
- Die Gewichte bei GLQ sind stets positiv
  - für  $n$  "nicht zu gross" sind die GLQ tabelliert  
Für grosse  $n$  werden die GLQ numerisch bestimmt (z.B. wie in Übung S03 ausgaufleg.m)
  - Es gilt stets: hohe Ordnung bedeutet nicht zwingend hohe Genauigkeit  
Die gilt nur wenn  $f$  glatt genug ist.
  - Allgemeiner betrachtet man
- $$I[f] = \int_a^b w(x) \cdot f(x) dx$$
- wobei  $w(x)$  eine nichtnegative Gewichtsfunktion ist:
- $w(x) = 1$   $\rightsquigarrow$  Gauss-Legendre
  - $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$   $\rightsquigarrow$  Gauss-Tschebyscheff
  - $w(x) = e^{-x^2}$   $\rightsquigarrow$  Gauss-Hermite
  - ...  $\rightsquigarrow w(x) = 1/\sqrt{x}$   $\rightsquigarrow$  Serie 3

(v) Manchmal beginnt der Summationsindex bei 1

$$G[f] = \sum_{j=1}^n w_j \cdot f(x_j)$$

Dann ist  $G_G = q = 2n-1$  und die  
Ordnung  $s = 2n$

## I.7 Adaptive Quadratur

Ziel: Berechne

$$I[f] = \int_a^b f(x) dx$$


bis auf eine vorgegebene Toleranz

$$|Q[f] - I[f]| < \epsilon_{tol}$$

so effizient wie möglich

d.h. mit so wenigen Funktionsauswertungen wie möglich

Idee: Anstatt das Intervall  $I = [a, b]$  in gleich grosse Teil-Intervalle aufzuteilen, verwendet feinere oder gröbere Teil-Intervalle je nachdem wie stark die Funktion  $f(x)$  variiert, oder äquivalent, wo der QF gross ist:



Dazu benötigen wir eine Schätzung des Fehlers.

Idee: Vergleiche das Resultat einer Methode mit dem Resultat einer genaueren Methode

$$\underline{\text{Bsp.: (15)}} \quad I[e^x] = \int_0^1 e^x dx = e - 1 = 1.71828\dots$$

$$\text{TR: } Q_1[e^x] = \frac{1}{2} \left( e^0 + e^1 \right) = 1.85914\dots$$

$$\text{SR: } Q_2[e^x] = \frac{1}{6} \left( e^0 + 4 \cdot e^{1/2} + e^1 \right) = 1.71886\dots$$

$$\text{STR: } Q_3[e^x] = \frac{1}{2} \left( e^0 + 2 \cdot e^{1/2} + e^1 \right) = 1.75393\dots$$

$$\text{Exakter Fehler: } |Q_1[e^x] - I[e^x]| = 0.14085\dots$$

$$\text{Schätzung 1: } |Q_1[e^x] - Q_2[e^x]| = 0.14027\dots$$

$$\text{Schätzung 2: } |Q_1[e^x] - Q_3[e^x]| = 0.10520\dots$$

Bsp. (15) zeigt, dass obige einfache Idee durchaus brauchbare Fehler-Schätzer liefert.

Untersuchen wir theoretisch die Schätzung 2, d.h. der Vergleich einer QR mit derselben QR aber mit halbiertem Teil-Intervall Länge, sog. Intervall-halbierungs Fehler-Schätzer.

Betrachten wir hierzu ein Intervall  $I = [a, b]$  und den QF einer QR der Ordnung  $s$

$$\epsilon[f] = |Q[f] - I[f]| \stackrel{(QFA)}{\leq} \frac{\|f^{(s)}\|_\infty}{s!} (b-a)^{s+1} = K \cdot (b-a)^{s+1}$$

Dies nennt man einen a priori Fehler-Schätzer. Dieser ist natürlich nur brauchbar, wenn  $\|f^{(s)}\|_\infty$  bzw.  $K$  bekannt ist (was i.A. natürlich nicht der Fall ist!).

Für den QF gilt also:

$$\epsilon^1[f] = |Q^1[f] - I[f]| \approx K \cdot (b-a)^{s+1}$$

$$\epsilon^2[f] = |Q^2[f] - I[f]| \approx K \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^{s+1} + K \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^{s+1}$$

fehler auf halben Teil-Int.

$$= \frac{K}{2^s} (b-a)^{s+1} = \frac{\epsilon^1[f]}{2^s}$$

Nun

+ O Trick!

$$\epsilon^*(f) = |Q^*(f) - Q^2(f) + Q^2(f) - I(f)|$$

$\Delta$ -UG

$$\leq |Q^*(f) - Q^2(f)| + \underbrace{|Q^2(f) - I(f)|}_{\approx \frac{\epsilon^*(f)}{2^s}}$$

$$\Rightarrow \epsilon^*(f) \approx \frac{2^s}{2^s - 1} |Q^*(f) - Q^2(f)|$$

und

$$\epsilon^2(f) \approx \frac{1}{2^s - 1} |Q^*(f) - Q^2(f)|$$

Dies sind sog. a posteriori Fehler-Schätzer.

Bsp.: (16) TR hat Ordnung  $s = 2$  und

es ergibt sich für Zahlen aus  
Bsp. (15) (Schätzung 2):

$$|Q_1(e^*) - I(e^*)| = 0.14085\dots$$

$$\approx \frac{2^2}{2^2 - 1} \cdot 0.10520\dots$$

$$= 0.1402\dots \checkmark$$

$$|Q_n[e^x] - I[e^x]| = 0.0356\dots$$

$$\approx \frac{1}{2^n} \cdot 0.10520\dots$$

$$= 0.0350\dots$$

✓

Nun haben wir alles zur Hand um einen adaptiven Quadratur Algorithmus zu bauen!

### Adaptive Quadratur (~ Pseudo-MATLAB-Code)

function  $Q = \text{adapt\_quad}(f, a, b, \text{tol})$

if  $E < \text{tol}$

$Q = \text{quad}(f, a, b)$

↳ zugrundeliegende QR

else

$Q_1 = \text{adapt\_quad}(f, a, \frac{a+b}{2}, \frac{\text{tol}}{2})$

REKURSIV ↗

$Q_2 = \text{adapt\_quad}(f, \frac{a+b}{2}, b, \frac{\text{tol}}{2})$

$Q = Q_1 + Q_2$

end

↑ halbiere

fehler-Toleranz da nun halbiertes Int.-Intervall!

## Bsp.: (17) Adaptive Simpson Quadratur

→ Slides

Bem.: (i) Adaptive Quadratur kann oft sehr effizient Integrale approximieren

(ii) Adaptive Quadratur kann auch schief gehen !

(iii) In MATLAB gibt es die Befehle quad und integral

## I.8 Zweidimensionale Quadratur

Bis jetzt haben wir nur ein-dimensionale Quadratur behandelt. Diese simple Methoden kann man relativ einfach auf zwei oder drei Dimensionen verallgemeinern (im Prinzip auch mehr, aber dann wird es sehr schnell sehr Teuer!).

In zwei Dimensionen:

$$I[f] = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$


$$\approx \sum_{i=0}^n w_i^x \cdot \int_c^d f(x_i, y) dy$$

Gewichte & Knoten in x-Koordinate

$$\approx \sum_{i=0}^n w_i^x \sum_{j=0}^m w_j^y \cdot f(x_i, y_j)$$

Gewichte & Knoten in y-Koord.

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m w_i^x \cdot w_j^y \cdot f(x_i, y_j)$$



Dies kann man auch einfach auf den Fall variabler Grenzen verallgemeinern:

$$I[f] = \int_a^b \int_{\phi_x(x)}^{\phi_y(x)} f(x, y) dx dy$$