

Die Single Choice-Aufgaben 1-20 bieten vier Aussagen an, von denen jeweils **genau eine** richtig ist. Für jede korrekte Antwort erhalten Sie 1 Punkt, für jede inkorrekte oder nicht gegebene Antwort erhalten Sie 0 Punkte. **Insbesondere lohnt es sich zu raten!**

1. Welcher der folgenden Vektoren ist ein Eigenvektor der Matrix  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ?

- (a)  $(0, 0, 0)^T$
- (b)  $(1, -2, -1)^T$
- (c)  $(1, 2, 1)^T$
- (d) Keiner der obigen Vektoren

2. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 15 \\ 0 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Was ist  $\dim \ker(A)$ ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 4
- (d) 2

3. Für welches  $a \in \mathbb{R}$  hat das folgende lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen?

$$\begin{aligned} x_1 &+ 2x_3 = 5 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 &= -1 \\ ax_1 + x_2 + 7x_3 &= 9 \end{aligned}$$

- (a)  $a = 0$ .
- (b)  $a = -2$
- (c)  $a = 2$
- (d)  $a = 1$

4. Was ist die Determinante der folgenden reellen Matrix?

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- (a) 4
- (b) -10
- (c) 10
- (d) 8

5. Sei

$$\mathcal{B} := \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

eine Basis von  $\mathbb{R}^3$ . Welche Basis  $\mathcal{C}$  von  $\mathbb{R}^3$  ergibt sich aus  $\mathcal{B}$  durch Anwendung des Gram-Schmidt-Verfahrens bezüglich des Standardskalarprodukts?

(a)

$$\mathcal{C} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

(b)

$$\mathcal{C} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

(c)

$$\mathcal{C} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

(d)

$$\mathcal{C} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

6. Sei  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -2 & 4 \\ 1 & 6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ . Welche der folgenden Aussagen ist *falsch*?

(a)  $A$  ist halbeinfach.

(b)  $A$  hat einen Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit  $> 1$ .

(c)  $A$  hat nur reelle Eigenwerte.

(d) Für alle ganzen Zahlen  $k \geq 1$  gilt  $A^k \neq 0$ .

7. Sei

$$A := \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Welches der folgenden Paare  $(Q, R)$  ist eine  $QR$ -Zerlegung von  $A$ ?

(a)

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & -\sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \sqrt{2} \\ -1 & -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & 1 & -\sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d)

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Für welche dieser Matrizen  $A$  ist  $A^{100}$  die Nullmatrix?

(a)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -\pi & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(c)  $A = \begin{pmatrix} 0 & \pi \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. Was sind Eigenwerte der Matrix  $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ ?

- (a) 0, 5, 5
- (b) 0, 0, 5
- (c) 2, 3, 5
- (d) -5, 0, 5

10. Was ist eine Basis von  $\text{im} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ?

- (a)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$
- (b)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$
- (c)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$
- (d)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

11. Sei  $U := \left\{ A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{3 \times 4} \mid \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 a_{i,j} = 0 \right\}$ . Welche der folgenden Aussagen ist *wahr*?

- (a)  $\dim(U) = 10$
- (b)  $\dim(U) = 1$
- (c)  $\dim(U) = 11$
- (d)  $U$  ist kein Vektorraum.

12. Seien

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & a \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für welches  $a \in \mathbb{R}$  gilt  $A^{-1} = B$ ?

- (a)  $a = 0$
- (b)  $a = -4$
- (c)  $a = 4$
- (d)  $a = 1$

13. Was ist eine Basis von  $\ker \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ ?

(a)  $\left( \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \right)$

(b)  $\left( \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$

(c)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

(d)  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

14. Sei  $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  und sei  $q_A(x) := x^T A x$  für  $x \in \mathbb{R}^2$  die zu  $A$  zugehörige quadratische Form.  
Sei  $X := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid q_A(x) = 1\}$ . Welche der folgenden Aussagen ist *wahr*?

- (a)  $X$  ist eine Hyperbel.
- (b)  $X$  ist die leere Menge.
- (c)  $X$  ist ein sich schneidendes Geradenpaar.
- (d)  $X$  ist eine Ellipse.

15. Welche der folgenden Teilmengen ist *kein* Untervektorraum?

- (a)  $\mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}^3$
- (b)  $\{A \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid A^T = A\} \subset \mathbb{C}^{n \times n}$  für  $n \in \mathbb{N}$ .
- (c)  $\{p \in \mathcal{P}_3 \mid p(1) = 0 \text{ und } p(1100) = 0\} \subset \mathcal{P}_3$ , wobei  $\mathcal{P}_n$  für  $n \in \mathbb{N}$  der Vektorraum der Polynome mit  $\text{Grad} \leq n$  ist.
- (d)  $\{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid |x_1| + |x_2| = |x_3|\} \subset \mathbb{R}^3$

16. Sei  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  eine Matrix. Welche der folgenden Aussagen ist im Allgemeinen *falsch*?

- (a) Wenn  $v$  ein Eigenvektor von  $A$  zum Eigenwert  $\lambda$  ist, dann ist  $v$  ein Eigenvektor von  $A^3$  zum Eigenwert  $\lambda^3$ .
- (b) Wenn  $v$  ein Eigenvektor von  $A^2$  ist, dann ist  $v$  auch ein Eigenvektor von  $A$ .
- (c) Falls  $A$  invertierbar ist gilt  $\det(A^{-3}) = \frac{1}{\det(A)^3}$ .
- (d) Wenn  $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  ähnlich zu  $A$  ist, dann ist  $B^3$  ähnlich zu  $A^3$ .

17. Sei

$$U := \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 = ax_3 \text{ und } x_1 + x_2 = x_3\}$$

und

$$V := \text{span} \{(2, 1, 3)^T, (1, -1, 0)^T\}.$$

Für welches  $a \in \mathbb{R}$  gilt  $U = V$ ?

- (a)  $a = 1$
- (b)  $a = 0$
- (c)  $a = -1$
- (d) Es gibt kein solches  $a$ .

18. Sei  $A \in \mathbb{R}^{4 \times n}$  mit  $\dim \ker(A) = 2$  und

$$\text{im}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Was ist  $n \in \mathbb{Z}$ ?

- (a)  $n = 4$
- (b)  $n = 3$
- (c)  $n = 5$
- (d) Die Angaben reichen nicht aus um  $n$  eindeutig zu bestimmen.

19. Sei  $\mathcal{P}_3$  der Vektorraum der Polynome vom Grad  $\leq 3$ . Auf  $\mathcal{P}_3$  sei das Skalarprodukt

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x) \cdot q(x) \, dx$$

gegeben. Wählen Sie eine Orthonormalbasis für den Vektorraum  $\text{span}\{x, x^2\}$ .

- (a)  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{7}{2}}x^3 \right\}$
- (b)  $\left\{ \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{2}}x^2 \right\}$
- (c)  $\left\{ \sqrt{\frac{3}{2}}x, \frac{\sqrt{15}}{4}(x - x^2) \right\}$
- (d)  $\{x, x^2\}$

20. Sei  $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  eine Matrix die  $N$  Einsen und sonst nur Nullen enthält. Welche der folgenden Aussagen ist *falsch*?
- (a) Wenn  $N > n$ , kann es sein, dass  $A$  orthogonal ist.
  - (b) Wenn  $n = N$  und  $A$  invertierbar ist, dann ist  $A$  orthogonal.
  - (c) Wenn  $A$  orthogonal ist, dann gibt es ein  $k \in \mathbb{Z}$  mit  $k > 0$ , so dass  $A^k$  die Einheitsmatrix ist.
  - (d) Wenn  $N < n$ , dann ist  $A$  nicht invertierbar.

Die Handaufgaben 21 bis 23 sollen mit einem sauberen Lösungsweg dokumentiert werden. Diese drei Aufgaben ergeben bei korrekter Lösung je 10 Punkte.

21. (10 Punkte)

(a) (2 Punkte) Gegeben sei das folgende überbestimmte lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &= 1 \\ -2x_1 &= 2 \\ x_1 + x_2 &= 3 \end{aligned}$$

Stellen Sie für die gegebenen Gleichungen die Normalgleichungen auf.

(b) (2 Punkt) Bestimmen Sie die Norm des Residuenvektors  $\|r\|$  für die Näherungslösung  $x = \left(-\frac{1}{3}, 2\right)^T$  des Gleichungssystems in (a).

(c) (4 Punkte) Sei

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Betrachten Sie die Normalgleichungen (unabhängig von denen in (a))

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -6 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A^T c$$

und lösen Sie diese für  $c = (1, 1, 1)^T$  und  $c = (-6, 12, 0)^T$  und  $c = (0, 2, 4)^T$ .

(d) (2 Punkte) Geben Sie eine Möglichkeit für  $c \in \mathbb{R}^3$  mit  $c \neq (0, 0, 0)^T$  an, so dass das Gleichungssystem  $Ax = c$  mindestens eine exakte Lösung hat. Wieviele exakte Lösungen  $x$  hat  $Ax = c$  für dieses  $c$ ? Begründen Sie ihre Antworten.



22. (10 Punkte) Sei  $V := \text{span}\{1, e^x, e^{-x}\}$  der Untervektorraum von  $\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ stetig}\}$  mit der Basis  $\mathcal{B} := (1, e^x, e^{-x})$ . Hierbei ist  $1 \in \mathcal{B}$  die konstante Funktion mit Wert  $1 \in \mathbb{R}$ .

- (a) (2 Punkte) Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix  $A$  der linearen Abbildung

$$F: V \rightarrow V$$

$$f(x) \mapsto f'(x) - 1$$

in der Basis  $\mathcal{B}$ .

- (b) (2 Punkte) Sei  $\mathcal{C} = \left(1, \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)$  eine weitere Basis von  $V$ . Bestimmen Sie die Übergangsmatrix  $T$  von  $\mathcal{B}$  zu  $\mathcal{C}$ .

- (c) (2 Punkte) Sei

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung  $G: V \rightarrow V$  in der Basis  $\mathcal{B}$ . Berechnen Sie die Darstellungsmatrix  $C$  von  $G$  bezüglich der Basen  $\mathcal{B}$  und  $\mathcal{C}$ , d.h. es gilt  $[G(x)]_{\mathcal{C}} = C[x]_{\mathcal{B}}$ .

*Hinweis:* Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie in Teil (b) die Übergangsmatrix korrekt berechnet haben, können Sie ersatzweise ohne Punktabzug annehmen, dass sie durch

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

- (d) (4 Punkte) Sei  $H := G^{-1}$  die inverse Abbildung von  $G$ . Berechnen Sie die Darstellungsmatrix  $D$  von  $H$  in der Basis  $\mathcal{B}$  und die Funktionswerte  $H(1)$  und  $H(e^x)$  und  $H(e^{-x})$ .

23. (10 Punkte)

- (a) (5 Punkte) Sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie die komplexen und reellen Eigenwerte und die zugehörigen Eigenräume von  $A$ .

- (b) (3 Punkte) Die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

hat die Eigenwerte  $\lambda_1 = -2$  und  $\lambda_2 = 2i$  und  $\lambda_3 = -2i$  mit den zugehörigen Eigenräumen

$$E_{-2} = \text{span}\{(1, 0, 0)^T\} \subset \mathbb{C}^3,$$

$$E_{2i} = \text{span}\{(3, 1, i)^T\} \subset \mathbb{C}^3,$$

$$E_{-2i} = \text{span}\{(3, 1, -i)^T\} \subset \mathbb{C}^3.$$

Bestimmen Sie die allgemeine *reelle* Lösung des linearen Differentialgleichungssystems  $y' = By$ .

- (c) (2 Punkte) Bestimmen Sie die Lösung von  $y' = By$  für die gilt  $y(0) = (1, 1, 1)^T$ .